

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - رینیزین® چگونه اثر می کند؟

- رینیزین® مهارکننده اختصاصی گیرنده‌های هیستامین (گیرنده‌های H1) می باشد و از این طریق اثرات آنتی هیستامینی خود را اعمال می کند.

ب- رینیزین® در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان حساسیت فصلی و پایدار، کهیر مزمن

نکاتی که باید قبل از مصرف رینیزین® به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف رینیزین® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی ستیریزین و هیدروکسی‌زین و سایر آنتی‌هیستامین‌ها از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف رینیزین® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف رینیزین® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی می‌باشید،
- اگر مبتلا به بیماری‌های انسداد ممانه و هیپرتروفی پروستات می‌باشید،
- اگر مبتلا به احتباس ادراری می‌باشید،
- اگر مبتلا به بیماری چشمی آب سیاه هستید،
- و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با رینیزین® مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف فرآورده‌های حاوی الکل
- آزیترومايسين، کلاریترومایسین و اریترومايسين
- فلوکونازول، کتوکونازول و مترونیدازول
- آب گریپ فورت

- سبزاپراید و دی‌زوپیرامید

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

ج- مقدار مصرف معمول رینیزین® چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

رینیت آلرژیک (فصلی یا دائمی) و کهیر مزمن

- بزرگسالان و کودکان ۶ سال به بالا: ۵ تا ۱۰ میلی گرم خوراکی یک بار در روز.
- کودکان ۲-۶ سال: ۲/۵ میلی گرم خوراکی حداکثر دو بار در روز (توصیه می‌گردد از شکل دارویی شربت استفاده شود).

توجه: سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان زیر دو سال ثابت نشده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف رینیزین® چیست؟

- در صورت بروز تحریکات معده می‌توانید این دارو را همراه غذا مصرف نمایید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی رینیزین® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- خواب آلودگی، خشکی دهان، تاری دید، عوارض گوارشی، احتباس ادراری، واکنش‌های حساسیتی، تنگی نفس و سردرد.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه رینیزین® حاوی ۳۰ عدد قرص ۱۰ میلی گرمی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری رینیزین® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.