

Erythromycin ethylsuccinate

Erythromycin 200mg/5ml (Powder for 100 ml Oral Suspension)

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهم ترین و شایع ترین عوارض دارویی اریترومايسين چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

۱- عوارضی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

شیوع کم: سمیت کبدی (تب، تهوع، استفراغ، راش پوستی، دل درد، خستگی غیر معمول، زردی پوست و چشم ها) و واکنش های افزایش حساسیت (کوتاه شدن تنفس، راش های پوستی و خارش).

نادر: سمیت قلبی به ویژه طولانی شدن QT (نامنظم شدن و کندی ضربان قلب، از دست رفتن هوشیاری و مرگ ناگهانی)، کاهش برگشت پذیر شنوایی (سرگیجه، تهوع، وزوز گوش و مشکلات شنوایی) و پانکراتیت (دل درد شدید، تهوع و استفراغ).

۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

شایع: ناراحتی های گوارشی (دردهای شکمی، اسهال، تهوع و استفراغ).

شیوع کم: کاندیدیازیس دهانی و واژنی.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه سوسپانسیون اریترومايسين اتیل سوکسینات 200mg/5ml حاوی پودر برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د- شرایط نگهداری داروی اریترومايسين چیست؟

- پودر خشک برای تهیه سوسپانسیون را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید. بعد از تهیه، سوسپانسیون آماده را در یخچال نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید و به مدت ۱۰ روز قابل مصرف می باشد.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Ery/96.11/01

می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول داروی اریترومايسين چیست؟
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دوز بزرگسالان:

- میزان مصرف معمول اریترومايسين اتیل سوکسینات ۴۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت و یا ۸۰۰ میلی گرم دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت) می باشد که ممکن است این پروتکل درمانی براساس نوع میکروارگانسیم بیمار و شدت بیماری و همچنین طول دوره درمان مورد نیاز، تغییر یابد.

توجه: حداکثر مقدار تجویزی ۴ گرم در روز می باشد.

دوز کودکان:

- مقدار مصرف اریترومايسين اتیل سوکسینات در کودکان ۷/۵ میلی گرم تا حداکثر ۱۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (7.5-12.5mg/kg) هر ۶ ساعت و یا ۱۵ میلی گرم تا حداکثر ۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (15-25mg/kg) هر ۱۲ ساعت (دو بار در روز) می باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی اریترومايسين چیست؟

- **طرز تهیه سوسپانسیون:** ابتدا بطری را تکان دهید تا ذرات پودر از هم باز شوند، سپس آب جوشیده سرد شده را در دو مرحله تا خط نشانه مشخص شده بر روی بدنه ظرف به پودر اضافه نموده و هر بار ظرف را به خوبی تکان دهید.

- قبل از هر بار مصرف ظرف را خوب تکان دهید و پیمانه را قبل و بعد از مصرف بشویید. پس از هر بار مصرف در ظرف را محکم ببندید.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

- این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا مصرف نمود (مصرف همزمان اریترومايسين اتیل سوکسینات با غذا موجب بهتر شدن جذب دارو می شود).

- مدت درمان در عفونت های استرپتوکوکی با اریترومايسين اتیل سوکسینات حداقل ده روز می باشد.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟
در صورت فراموشی کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.



اریترومایسین اتیل سوکسینات

اریترومایسین 200mg/5ml (پودر برای تهیه 100 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی)

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - داروی اریترومایسین چگونه اثر می کند؟

- اریترومایسین از دسته آنتی بیوتیک های ماکرولیدی است که با اتصال به زیر واحد ریبوزومی 50S میکروارگانیزم های حساس، سنتز پروتئین را در آنها مختل می کند.

ب - داروی اریترومایسین در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

این دارو در درمان بیماران مبتلا به عفونت های ناشی از میکروارگانیزم های حساس به دارو در موارد ذیل تجویز می گردد:

- در درمان برونشیت باکتریایی، التهاب گوش میانی، سینوزیت حاد باکتریایی، عفونت های کلامیدیایی مجاری ادراری، رحمی و ذات الریه (ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس)، دیفتتری (پیشگیری و درمان)، اندوکاردیت باکتریایی (پیشگیری)، اریتراسما (ناشی از کورینه باکتریوم)، عفونت گونوککی مجاری ادراری و رحمی (ناشی از نیسریا گونوره)، عفونت های ناشی از لژیونلا پنوموفیلا و یا لیستریا مونوسیژون، سیاه سرفه، فارنژیت (ناشی از استرپتوکوک)، ذات الریه (ناشی از میکوپلاسم پنومونیه و استرپتوکوک پنومونیه)، تب روماتیسمی (پیشگیری)، عفونت های پوست و بافت های نرم (ناشی از استرپتوکوک پیوژن)، سیفلیس، اورتریت غیر گونوککی، آکنه، اکتینومایکوز، سیاه زخم، شانکروئید، کمپیلوباکتر، لنفوگرانولوما و تب عود کننده.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی اریترومایسین به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف داروی اریترومایسین خودداری کرد؟

- حساسیت شدید به اریترومایسین و سایر آنتی بیوتیک های ماکرولیدی و یا هر یک از اجزا متشکله.

- مصرف همزمان اریترومایسین و داروهای آستمیزول، سیزاپراید، پیموزاید و ترفنادین ممنوع است.

ت - ملاحظات مصرف داروی اریترومایسین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:
سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را

در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، استفاده از آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

ث - مواردی را که قبل از مصرف داروی اریترومایسین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر به بیماری های کبدی، کلیوی و یا آریتمی قلبی مبتلا هستید.

- اگر مبتلا به ضعف عضلانی هستید.

- اگر سابقه اختلال شنوایی دارید.

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

توجه: مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمایشات آنزیم های کبدی (AST و ALT) و کاتکول آمین های ادراری می گردد.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی اریترومایسین مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف همزمان اریترومایسین اتیل سوکسینات با تئوفیلین، دیگوکسین، داروهای ضد انعقاد خوراکی نظیر وارفارین و داروهای که توسط سیستم آنزیم کبدی سیتوکروم P450 متابولیزه می شوند نظیر کاربامازپین، سیکلوسپورین، والپروئیک اسید، تاکرولیموس، آلفنتانیل، دیسوپرامید، ریفابوتین، کینیدین، متیل پردنیزولون، سیلواستازول، وین بلاستین، بروموکریپتین و همچنین داروهای ارگوتامین، دی هیدروارگوتامین، میدازولام، تریازولام، آلپروزولام، لوواستاتین، سیمواستاتین، سیلدنافیل، سیزاپراید، پیموزاید، آستمیزول، ترفنادین، کلرامفنیکل و لینکومایسین دارای تداخل می باشد.

- احتمال بروز کولیت با غشای کاذب متعاقب مصرف بعضی از آنتی بیوتیک ها وجود دارد لذا توصیه می گردد در صورت بروز علائم نظیر سوزش و دردهای شکمی شدید، اسهال شدید و آبکی گاهی همراه با خون و تب، بیمار بلافاصله مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک خویش اطلاع دهد.

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف

