

حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی نکسیو® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر دچار کمبود ویتامین B12 و یا منیزیم خون می باشید،
- اگر مبتلا به بیماری لوپوس پوستی یا منتشر می باشید،
- اگر مستعد بیماری پوکی استخوان می باشید،
- اگر مبتلا به بیماری های کبدی می باشید،
- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می باشید،
- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
- اگر در دوران شیردهی می باشید،

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی نکسیو®، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- تاکرولیموس و متوترکسات
- دیگوکسین و کلپیدوگرل

- کتوکونازول

- وارفارین

- ریفامپین

- دیازپام

- داروهایی حاوی نمک های آهن

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول داروی نکسیو® چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی نکسیو® چگونه اثر می کند؟

- نکسیو® مهارکننده انتخابی و برگشت ناپذیر پمپ پروتون می باشد که باعث کاهش ترشح اسید در معده می گردد.

ب- داروی نکسیو® در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان کوتاه مدت زخم های ایجاد شده در مری بر اثر برگشت اسید معده به مری،

- درمان نگهدارنده و پیشگیرانه طولانی مدت در التهاب مری در حال بهبود در بیماران مبتلا به برگشت اسید معده به مری،

- درمان زخم معده و زخم دوازدهه به تنهایی یا همراه با داروهای ضد هلیکوباکتر پیلوری،

- پیشگیری از ایجاد زخم های گوارشی بر اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر آسپرین و ناپروکسن،

- درمان بلند مدت ترشح بیش از حد اسید معده در شرایط بیماری زا نظیر بیماری سندرم زولینگر-الیسون.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی نکسیو® به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی نکسیو® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی اس امپرازول و سایر داروهای مهار کننده پمپ پروتون نظیر امپرازول از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف داروی نکسیو® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی

Nexive® Esomeprazole Capsules (E.C.) 20 & 40mg

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی نکسیو® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

شایع:

مشکلات گوارشی نظیر دردهای شکمی، یبوست، اسهال، نفخ، تهوع و استفراغ.

شیوع کم:

دردهای مفصلی و عضلانی، خستگی، سرگیجه، خشکی دهان، خارش و اختلالات خواب.

نادر:

- ریزش مو، واکنش‌های حساسیتی، اختلالات خونی، برونکواسپاسم، افسردگی، تب، ژنیکوماستی (بزرگ شدن پستان در مردان)، تومور، هیپاتیت، زردی و اختلالات بینایی.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه نکسیو® ۲۰ و یا نکسیو® ۴۰ حاوی ۳۰ کپسول انتریک‌کوتد (۳ بلیستر ۱۰ عددی) اس‌امپرازول ۲۰ و یا ۴۰ میلی‌گرمی به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری داروی نکسیو® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: www.dorsadarou.com

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Nex/98.02/00

دوز بزرگسالان:

- در درمان بیماری بازگشت اسید به مری در موارد ازوفازیت اروزو- در بزرگسالان ۲۰-۴۰ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد که در اکثریت بیماران بهبودی در طول ۸-۴ هفته حاصل می‌گردد. البته در موارد عدم بهبودی می‌توان این دوره را تکرار نمود. درمان نگهدارنده در این بیماران ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد.

- جهت کاهش احتمال بروز زخم‌های گوارشی ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی در بزرگسالان ۲۰-۴۰ میلی‌گرم یکبار در روز تا مدت ۶ ماه تجویز می‌گردد.

- در درمان سندرم زولینگر-الیسون ۴۰ میلی‌گرم دوبار در روز تجویز می‌گردد که مقدار دوز براساس پاسخ درمانی بیمار ممکن است تا ۲۴۰ میلی‌گرم در روز در دوزهای منقسم افزایش یابد.

- در ریشه‌کنی باکتری هلیکوباکتر پیلوری در زخم‌های دوازدهه ناشی از آن در رژیم‌های چند دارویی در بزرگسالان ۴۰ میلی‌گرم یکبار در روز به مدت ۱۰ روز تجویز می‌گردد.

دوز کودکان بالای ۱۲ سال:

- در درمان کوتاه مدت زخم‌های ایجاد شده در مری بر اثر برگشت اسید معده به مری ۲۰ تا ۴۰ میلی‌گرم یکبار در روز به مدت حداکثر ۸ هفته تجویز می‌گردد.

توجه: در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی و یا سیروز کبدی حداکثر مقدار مصرف ۲۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

توجه: مطالعاتی حاکی از سودمندی مصرف این دارو بیش از ۶ ماه وجود ندارد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی نکسیو® چیست؟

- دارو را حداقل یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

- دارو را به طور کامل بلعیده و از خورد کردن، جویدن و باز کردن آن خودداری نمایید.

- در صورت عدم توانایی بیمار در بلعیدن این دارو، می‌توان محتویات داخل کپسول را خالی کرده و بلافاصله به همراه نوشیدنی بلعید و توصیه می‌گردد از جویدن محتویات داخل کپسول نیز خودداری گردد.

- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را قطع نکنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

