

## گاباپنتین کیسول ۱۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم

حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

### - مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابر این مصرف آن در دوران شیردهی تنها در حالتی مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.

ت- مواردی را که قبل از مصرف گاباپنتین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به افسردگی و یا مشکلات خلقی می‌باشید،
- اگر مبتلا به دیابت شیرین (نوع ۲) می‌باشید،
- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می‌باشید و یا تحت همودیالیز هستید،
- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
- اگر در دوران شیردهی می‌باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی گاباپنتین، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی‌اسید باید با احتیاط صورت گیرد زیرا فراهمی زیستی گاباپنتین را کاهش می‌دهد.

- مرفین جذب این دارو را افزایش داده و موجب تشدید اثرات مضعف CNS آن می‌شود.

- سایمتیدین

- ناپروکسن

- الکل

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول داروی گاباپنتین چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

هشدار: احتمال ایجاد اختلال تنفسی (دپرسیون سیستم تنفسی) متعاقب مصرف این دارو در بیماران دارای سابقه اختلال تنفسی، نارسایی کلیوی، افراد مسن و یا استفاده همزمان با داروهای مضعف کننده سیستم عصبی مرکزی وجود دارد لذا تنظیم مقدار مصرفی در این بیماران ضروری می‌باشد. همچنین با توجه به خطر سوء مصرف و وابستگی این دارو توصیه می‌شود قبل از تجویز، بیمار از نظر سابقه سوء مصرف دارو با دقت ارزیابی شود و نسبت به احتمال بروز خطرات بالقوه کشنده در صورت مصرف همزمان با الکل، داروهای مسکن مخدر و سایر داروهای مضعف کننده سیستم عصبی مرکزی به بیمار اطلاع‌رسانی گردد.

### الف- داروی گاباپنتین چگونه اثر می‌کند؟

- مکانیسم دقیق داروی گاباپنتین ناشناخته است. این دارو به جایگاه خاصی در اعصاب قشر مغز متصل شده و با انتقال اسیدهای آمینه از طریق غشاء سلول تداخل می‌کند. این دارو ممکن است باعث افزایش آزادسازی GABA از محل غیر وزیکولی شود.

ب- داروی گاباپنتین در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان کمکی صرع پارشیال همراه با داروهای ضد تشنج دیگر

- درمان دردهای نورالژی (درد عصبی) پس از عفونت هرپسی و نوروپاتی نکاتی که باید قبل از مصرف داروی گاباپنتین به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف گاباپنتین خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی گاباپنتین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف داروی گاباپنتین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در



# Gabapentin

## Capsules 100, 300 & 400mg

معمول دارو به شرح ذیل است:

- **بیماران بالای ۱۲ سال:**

- **درمان کمکی صرع پارشیال:** ابتدا ۹۰۰ میلی گرم در روز در ۳ نوبت منقسم تجویز می شود. سپس مقدار مصرف بر اساس پاسخ بیمار به درمان به تدریج افزایش می یابد و معمولاً مقدار ۹۰۰-۱۸۰۰ میلی گرم در روز برای بیشتر بیماران موثر است. حداکثر مقدار تجویزی تا ۳۶۰۰ میلی گرم در روز می باشد. زمانی که دارو برای ۳ بار در روز تجویز می شود توصیه می شود فاصله بین دو نوبت از مصرف ۱۲ ساعت باشد.

**توجه: مقدار تجویزی در افراد سالمند و بیماران دارای اختلال عملکرد کلیوی و یا تحت همودیالیز می باشند باید براساس عملکرد کلیه تنظیم گردد.**

- **درمان دردهای عصبی پس از عفونت هرپسی:** روز اول مقدار ۳۰۰ میلی گرم هنگام خواب، روز دوم ۶۰۰ میلی گرم در روز در دو نوبت منقسم و روز سوم ۹۰۰ میلی گرم در سه نوبت منقسم تجویز می شود و مقدار مصرف براساس پاسخ بیمار به درمان تا حداکثر ۱۸۰۰ میلی گرم در روز قابل افزایش است.

- **کودکان:**

- **درمان کمکی صرع پارشیال:** در کودکان ۳ تا ۱۲ سال ابتدا به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار مقدار ۱۵-۱۰ میلی گرم روزانه محاسبه شده و در سه نوبت منقسم تجویز می شود. سپس با توجه به پاسخ بیمار به درمان مقدار مصرف تنظیم می گردد. بر همین اساس معمولاً برای کودکان بالای ۵ سال مقدار مصرف موثر ۲۵-۳۵ mg/kg/day در سه نوبت منقسم و برای کودکان ۳ تا ۴ سال نیز مقدار مصرف ۴۰ mg/kg/day در سه نوبت منقسم می باشد.

**توجه: تجویز داروی گاباپنتین در کودکان زیر ۱۲ سال مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی مطالعه نشده است.**

**نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی گاباپنتین چیست؟**

- دارو را به طور کامل بلعیده و از باز کردن کپسول و له کردن آن در دهان خودداری کنید.

- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون آن مصرف نمود.  
- دو ساعت قبل و یا بعد از مصرف این دارو از مصرف داروهایی که در درمان سوء هاضمه به کار می روند، خودداری نمایید.

- به علت بروز تاری دید یا دوبینی، گیجی، خواب آلودگی، اختلالات فکری یا مهارت های حرکتی، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به

هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید.

- بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.

**در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟**  
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

**در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟**

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**ح- مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی داروی گاباپنتین چیست؟**

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

خواب آلودگی، تاری دید یا دوبینی، گیجی، بی ثباتی عاطفی، افسردگی، تهوع و استفراغ، برونشیت، عفونت های ویروسی، تب، سرگیجه، خستگی، نیستاگموس، رینیت، لرزش، ضعف، سردرد، ادم محیطی، افزایش وزن، اسهال، یبوست و خشکی دهان.

**خ- مشخصات دارو:**

هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد کپسول گاباپنتین ۱۰۰ و یا ۳۰۰ و یا ۴۰۰ میلی گرمی (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می باشد.

**د- شرایط نگهداری داروی گاباپنتین چیست؟**

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده اند، خودداری نمایید.

[www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)

سایت اینترنتی: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)

رایانامه جهت ارتباط مشتری: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)  
Des.Lef.Gab/00.07/01



[www.dorsapharma.com](http://www.dorsapharma.com)



[dorsadarou](https://www.instagram.com/dorsadarou)



021- 54612000



تهران-طرحت-محله تیموری-بلوار شهید صالحی  
نبش سه راه اکبری-برج فناوری شریف-طبقه هشتم