

## بوسکوپکس

هیوسین آن- بوتیل بروماید (قرص روکشدار خط‌دار ۱۰ میلی‌گرم)

### این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

### الف- بوسکوپکس چگونه اثر می‌کند؟

- **بوسکوپکس** (هیوسین آن-بوتیل بروماید) از دسته دارویی آنتی موسکارین است که با مهار گیرنده‌های موسکارینی، مانع بروز اثرات استیل کولین بر گیرنده‌های مذکور می‌شود.

### ب- بوسکوپکس در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- کاهش علائم ناشی از اسپاسم عضلات صاف در اختلالات گوارشی، ادراری و تناسلی؛

- سندرم روده تحریک پذیر؛

- اسپاسم حاد ناشی از انجام روش‌های تشخیصی؛

- ترشحات بیش از حد دستگاه تنفسی؛

- کولیک روده؛

**نکاتی که باید قبل از مصرف بوسکوپکس به آنها توجه نمود:**

**پ- در چه مواردی باید از مصرف بوسکوپکس خودداری کرد؟**

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی هیوسین آن-بوتیل بروماید و یا سایر اجزای متشکله دارو؛

- در صورت وجود حساسیت به داروهای آنتی کولینرژیک (بلادونا) و باربیتورات‌ها؛

- در صورت وجود بیماری‌های گلوکوم با زاویه بسته، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های انسدادی دستگاه گوارش و مجاری ادراری، میاستنی گراویس؛

از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

**ت- ملاحظات مصرف بوسکوپکس در دوران بارداری و شیردهی چیست؟**

- **مصرف در بارداری:**

- سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

### - مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی تنها در حالتی مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.

**ث- مواردی را که قبل از مصرف بوسکوپکس باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟**

- اگر مبتلا به زخم‌های دستگاه گوارش هستید؛

- اگر مبتلا به بیماری‌های قلبی هستید؛

- اگر مبتلا به بیماری‌های کبدی و کلیوی هستید؛

- اگر مبتلا به بیماری گلوکوم هستید؛

- اگر مبتلا به اختلالات تنفسی هستید؛

- اگر مبتلا به نوروپاتی اتونوم و کم کاری تیروئید هستید؛

- اگر مبتلا به گرم‌زدگی و اسهال هستید؛

- در صورت ابتلا به سایکوز ناشی از مصرف داروهای آنتی‌کولینرژیک و یا پارکینسون؛

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛

- اگر در دوران شیردهی هستید؛

- همچنین نوزادان، کودکان، افراد سالمند، افراد با سندرم داون، افراد با آسیب مغزی یا فلج انقباضی؛

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

**ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با بوسکوپکس، مطلع کردن پزشک مهم است؟**

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا



## Buscopex

Hyoscine N-butylbromide (Scored F.C. Tablets 10 mg)

بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

**در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟**  
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی بوسکوپکس چیست؟**

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود؛ در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است، با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- خشکی دهان، مشکل در دفع ادرار، یبوست، افزایش حساسیت به نور، هیجان، بی‌قراری، توهّم، هذیان، تاری دید، راش‌های پوستی، برافروختگی، درد چشم.

توجه: مصرف این دارو ممکن است باعث خواب‌آلودگی، سرگیجه و یا تاری دید گردد. لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

**خ- مشخصات دارو:**

هر جعبه بوسکوپکس حاوی ۱۰۰ عدد قرص روکشدار خطدار (۵ بلیستر ۲۰ عددی) ۱۰ میلی‌گرمی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

**د- شرایط نگهداری بوسکوپکس چیست؟**

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.  
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.  
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

[www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)

Des.Lef.Hyo/99.04/00

دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- آمانتادین، آنتولول، دیگوکسین؛

- فنوتیازین‌ها مانند: پرفنازین، تری فلوپرازین؛

- ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای مانند: آمی‌تریپتیلین، نورتریپتیلین؛

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

**چ- مقدار مصرف معمول بوسکوپکس چیست؟**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- کاهش علائم ناشی از اسپاسم عضلات صاف در اختلالات گوارشی، ادراری و تناسلی:

کودکان ۶ تا ۱۱ سال: ۱۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز؛

بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال: ۲۰ میلی‌گرم ۴ بار در روز؛

- سندرم روده تحریک پذیر:

بزرگسالان: ۱۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز- در صورت نیاز تا ۲۰ میلی‌گرم ۴ بار در روز افزایش داده شود؛

- ترشحات بیش از حد دستگاه تنفسی و کولیک روده:

کودکان ۲ تا ۴ سال: ۵ میلی‌گرم ۳ تا ۴ بار در روز؛

کودکان ۵ تا ۱۱ سال: ۱۰ میلی‌گرم ۳ تا ۴ بار در روز؛

کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال: ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم ۳ تا ۴ بار در روز؛

**نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف بوسکوپکس چیست؟**

- دارو را ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از غذا میل نمایید.

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک، تجاوز ننمایید.

**در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟**

در صورت فراموشی کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت