

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظر تان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - داروی لیپیکات® چگونه اثر می کند؟

- لیپیکات® با مهار آنزیم اصلی سازنده اولیه کلسترول در بدن، موجب کاهش تولید کلسترول می گردد.

ب - داروی لیپیکات® در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان کمکی همراه رژیم غذایی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید خون در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه

- درمان اولیه و یا کمکی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و کلسترول تام خون در بیماران مبتلا به انواع هایپرکلسترولمی فامیلیال

- پیشگیری از حملات قلبی و سکنه های مغزی.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی لیپیکات® به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف داروی لیپیکات® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی آتورواستاتین، مبتلا بودن به بیماری فعال کبدی و یا افزایش بدون توضیح آنزیم های کبدی، بارداری و شیردهی از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - ملاحظات مصرف داروی لیپیکات® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه X قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار و انسان حاکی از خطرات جدی بر روی جنین است، بنابراین به طور کلی مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

- مصرف در شیردهی:

علی رغم این که اطلاعاتی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر وجود ندارد اما از آنجایی که مطالعات انجام گرفته بیانگر ترشح این دارو در شیر موش های صحرایی می باشد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث - مواردی را که قبل از مصرف داروی لیپیکات® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به بیماری های کبدی می باشید،

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می باشید،

- اگر سابقه مصرف الکل دارید،

- اگر مبتلا به بیماری عضلانی، کم کاری غده تیروئید کنترل نشده و صرع می باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی لیپیکات®، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهایی بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- آمیودارون، دیگوکسین، دیلتیازم، وراپامیل، جمفیبروزیل، نیاسین،

- آنتی اسیدها، سایمتیدین، رانیتیدین، کلسیرامین،

- ضدقارچ های آزول (فلوکونازول، ایتراکونازول و کتوکونازول)

- آنتی بیوتیک های ماکرولیدی (آزیترومایسین، کلاریترومایسین و اریترومایسین)

- سیکلوسپورین، ضد بارداری های خوراکی،

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ - مقدار مصرف معمول داروی لیپیکات® چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:



Lipi-Cut®

Atorvastatin (F.C. Tablets 10, 20 & 40mg)

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به معنی -
یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت
بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار
مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به
پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهمترین و شایعترین عوارض دارویی لیپیکات® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی
عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد
دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای
که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر
داروساز خود مشورت نمایید.

- شایع:

سر درد، اسهال، تهوع، سرگیجه، عفونت و یبوست.

- شیوع کم و نادر:

کمر درد، درد عضلانی، نفخ، راش پوستی، سینوزیت، اختلال
عملکرد کبدی و علائم شبه سرماخوردگی.

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص روکشدار لیپیکات® ۱۰، ۲۰ و
یا ۴۰ میلی‌گرمی (سه بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه
راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د - شرایط نگهداری داروی لیپیکات® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و
رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری
نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Ato/94.05/00

دوز بزرگسالان:

- در درمان بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه و
تری‌گلیسرید خون مقدار اولیه ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز
می‌باشد و در بیمارانی که احتیاج به کاهش بیشتر LDL-C
(بیش از ۴۵٪) دارند این میزان ۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
میزان دوز نگهدارنده دریافتی بر اساس نیاز بیمار و پاسخ‌های
درمانی در طی یک دوره ۴-۲ هفته‌ای توسط پزشک تنظیم
می‌گردد. حداکثر مقدار تجویزی ۸۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
- در درمان هایپرکلسترولمی فامیلیال مقدار اولیه ۱۰ میلی‌گرم
یکبار در روز می‌باشد که ممکن است بر اساس نیاز بیمار و
پاسخ‌های درمانی در طی یک دوره ۴ هفته‌ای توسط پزشک این
میزان به مقدار ۴۰ میلی‌گرم در روز افزایش یابد. حداکثر مقدار
تجویزی ۸۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
- در پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی ۱۰ میلی‌گرم
یکبار در روز تجویز می‌گردد.

دوز کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال:

- در درمان هایپرکلسترولمی فامیلیال مقدار ۱۰ میلی‌گرم یکبار
در روز می‌باشد که ممکن است بر اساس نیاز بیمار و پاسخ‌های
درمانی در طی یک دوره ۴ هفته‌ای توسط پزشک این میزان به
مقدار ۲۰ میلی‌گرم در روز افزایش یابد. حداکثر مقدار تجویزی
۲۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

**توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در کودکان زیر
۱۰ سال هنوز به اثبات نرسیده است.**

**نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی
لیپیکات® چیست؟**

- در دوران مصرف این دارو، از الکل و آب گریپ فروت استفاده
نکنید.

- این دارو را بدون در نظر گرفتن وعده غذایی به صورت تک
دوز و در یک زمان معین مصرف نمایید.

- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را
قطع نکنید.

**در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید
کرد؟**

