

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

### الف - داروی لوزارتان چگونه اثر می کند؟

لوزارتان با مسدود کردن انتخابی گیرنده های تنگ کننده عروق که در بسیاری از بافت ها قرار دارند، باعث کاهش فشار خون می شود.

### ب - داروی لوزارتان در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- کنترل و کاهش فشار خون بالا،

- کاهش خطر سکتة مغزی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا با هایپرتروفی بطن چپ،

- درمان نفروپاتی (بیماری کلیوی پیش رونده) ناشی از دیابت نوع ۲،  
**نکاتی که باید قبل از مصرف داروی لوزارتان به آنها توجه نمود:**

### پ - در چه مواردی باید از مصرف داروی لوزارتان خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی لوزارتان، بارداری و شیردهی از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

### ت - ملاحظات مصرف داروی لوزارتان در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در سه ماهه اول حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

همچنین انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در سه ماهه دوم و سوم حاملگی جزو گروه D قرار داده است، بدین معنی که اطلاعات بدست آمده از تحقیقات و یا گزارش هایی که پس از عرضه دارو به بازار مصرف منتشر شده است احتمال بروز خطر برای جنین انسان را نشان داده است. بنابراین مصرف آن در شرایط ویژه که بیماری خطرناک و تهدید کننده زندگی وجود دارد و داروی کم خطرتری نیز برای جایگزینی وجود ندارد می باشد و باید منافع استفاده از دارو در برابر احتمال بروز مضرات آن مد نظر قرار گیرد.

بنابراین به طور کلی مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است، مگر به تشخیص پزشک متخصص.

### - مصرف در شیردهی:

علی رغم این که شواهدی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر تا کنون وجود ندارد، اما از آنجایی که مطالعات بیانگر این است که این دارو در شیر موش های صحرایی ترشح می شود، به دلیل بروز عوارض جانبی احتمالی دارو برای نوزاد شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

### ث - مواردی را که قبل از مصرف داروی لوزارتان باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به بیماری های کبدی می باشید،

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می باشید،

- اگر مبتلا به تهوع یا اسهال می باشید،

- اگر در دوران بارداری و یا شیردهی می باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

### ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی لوزارتان، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهایی بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- سایمتیدین، فلوکونازول،

- ریفامپین و ایندومتاسین،

- لیتیم،

- دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم و مکمل های پتاسیم،

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف



# Losartan

## F.C. Scored Tablets 25 & 50 mg

مصرف نمایید.

- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را قطع نکنید.

**در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟**

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

**در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟**

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی داروی لوزارتان چیست؟**

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

سرفه، اسهال، سرگیجه، ضعف و خستگی، سردرد، گلو درد، سینوزیت، احتقان بینی و عفونت مجاری تنفسی.

**خ- مشخصات دارو:**

هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد قرص روکشدار خطدار لوزارتان ۲۵ و یا ۵۰ میلی‌گرمی (ده بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

**د- شرایط نگهداری داروی لوزارتان چیست؟**

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند خودداری نمایید.

می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

**چ- مقدار مصرف معمول داروی لوزارتان چیست؟**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

**دوز بزرگسالان:**

- به منظور کنترل و کاهش فشار خون بالا دوز اولیه ۵۰ میلی‌گرم یکبار در روز و در بیمارانی که به علت مصرف داروهای مدر مبتلا به کاهش حجم خون هستند و یا دارای نارسایی کبدی می‌باشند، دوز اولیه ۲۵ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد.

مقدار دوز نگهدارنده ۱۰۰-۲۵ میلی‌گرم به صورت تک دوز و یا دو بار در روز تجویز می‌گردد.

- به منظور کاهش خطر سکنه مغزی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا با هایپرتروفی بطن چپ دوز اولیه ۵۰ میلی‌گرم یکبار در روز شروع شده و براساس پاسخ فشار خون بیمار می‌توان ۱۲/۵ میلی‌گرم هیدروکلروتیازید یکبار در روز اضافه نمود و یا دوز لوزارتان را به ۱۰۰ میلی‌گرم یکبار در روز افزایش داد. همچنین می‌توان هر دو اقدام فوق را همراه با هم انجام داد و در صورت نیاز به کاهش بیشتر فشار خون، دوز هیدروکلروتیازید را به ۲۵ میلی‌گرم یکبار در روز افزایش داد.

- در درمان نفروپاتی (بیماری کلیوی پیش‌رونده) ناشی از دیابت نوع ۲ مقدار دوز اولیه ۵۰ میلی‌گرم یکبار در روز شروع شده و براساس پاسخ فشار خون بیمار می‌توان دوز تجویزی را تا ۱۰۰ میلی‌گرم یکبار در روز افزایش داد.

**دوز کودکان بالای ۶ سال:**

- به منظور کنترل و کاهش فشار خون بالا دوز اولیه ۰/۷ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یکبار در روز تا حداکثر ۵۰ میلی‌گرم تجویز می‌گردد.

توجه: حداکثر دوز روزانه ۱/۴ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا حداکثر ۱۰۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد.

**نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی لوزارتان چیست؟**

- می‌توانید این دارو را بدون در نظر گرفتن وعده غذایی

[www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)

Des.Lef.Los/94.05/00



[www.dorsapharma.com](http://www.dorsapharma.com)



[dorsadarou](https://www.instagram.com/dorsadarou)



021- 54612000



تهران- طرشت- محله تیموری- بلوار شهید صالحی  
نبش سه راه اکبری- برج فناوری شریف- طبقه هشتم