

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - متوپرولول چگونه اثر می کند؟

- **متوپرولول** گیرنده های بتا یک ($\beta 1$) را به صورت انتخابی در قلب و در مقادیر بالاتر گیرنده های بتا دو ($\beta 2$) در عضلات برونشیا و عروق را مهار نموده و موجب اثر کاهندگی فشار خون می شود.

ب - متوپرولول در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

این دارو برای درمان آنژین صدری مزمن، کنترل پرفشاری خون و پیشگیری از انفارکتوس میوکارد تجویز می شود.

نکاتی که باید قبل از مصرف متوپرولول به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف متوپرولول خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی متوپرولول و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن و همچنین شوک قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک درجه دو و یا سه دهلیزی-بطنی، برادیکاردی سینوسی و کاهش فشار خون سیستولیک کمتر از ۱۰۰ میلی متر جیوه از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - ملاحظات مصرف متوپرولول در دوران بارداری و

شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردارحاکمی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود

نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی تنها در حالتی مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.

ث - مواردی را که قبل از مصرف متوپرولول باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر سابقه آلرژی و آسم نایزهای دارید،

- اگر مبتلا به بیماری برونشیت غیر آلرژیک هستید،

- اگر دچار نارسایی احتقانی قلب و کلیه هستید،

- اگر مبتلا به دیابت هستید،

- اگر مبتلا به پرکاری تیروئید و افسردگی روانی هستید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می باشید،

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با متوپرولول، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- انسولین و داروهای خوراکی پایین آورنده ی قند خون

- سایمتیدین

- تیوفیلین و گزانتین

- کلونیدین

- پرازوسین

- ایزوکاربوکسازید و سلژیلین

- گاباپنتین و لیدوکائین

- سولفونیل اورها

- هورمون های تیروئیدی

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند

Metoprolol tartrate Scored Tablets 50mg

آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی متوپرولول چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

برادیکاردی (کاهش ضربان قلب)، اسپاسم، نارسایی احتقانی قلب، کاهش گردش خون محیطی (سردی دست و پا)، افسردگی و ادم.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد قرص خط دار متوپرولول ۵۰ میلی گرمی (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د- شرایط نگهداری متوپرولول چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Meto/96.04/00

را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول متوپرولول چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- بزرگسالان:

- به عنوان کاهنده فشار خون: شروع درمان با مقدار اولیه ۱۰۰ میلی گرم در روز آغاز می شود و درمان نگهدارنده با مقدار ۲۰۰ میلی گرم در روز در یک یا دو نوبت منقسم ادامه پیدا می کند. حداکثر مقدار مصرف روزانه ۴۰۰ میلی گرم می باشد.

- درمان آنژین صدری: مقدار ۱۰۰-۵۰ میلی گرم در دو تا سه نوبت منقسم در روز تجویز می شود.

- به عنوان ضد آریتمی: مقدار معمول تجویزی در شروع درمان ۵۰ میلی گرم دو تا سه نوبت در روز می باشد. سپس در صورت نیاز این مقدار تا ۳۰۰ میلی گرم در روز در چند نوبت منقسم افزایش پیدا می کند.

- پیشگیری از میگرن: مقدار ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم چند نوبت منقسم در روز تجویز می شود.

- درمان کمکی در هیپرتیروئیدی: مقدار ۵۰ میلی گرم چهار بار در روز تجویز می شود.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف متوپرولول چیست؟

- این دارو را باید قبل از صرف صبحانه و شام میل نمایید.
- به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگی و گیجی، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید با احتیاط مصرف شود.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد

