

مترونیدازول

قرص روکشدار خطدار ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی مترونیدازول چگونه اثر می کند؟

- **مترونیدازول** از دسته دارویی آنتی بیوتیکها است و از طریق تخریب دیواره سلولی میکروارگانیسم در محیط بی هوازی اثر می کند.

ب- داروی مترونیدازول در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- در درمان عفونت های بی هوازی؛ درمان زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در روش های درمانی چند دارویی؛ درمان فیستول بیماری کرون؛ درمان زخم پا و زخم بستر؛ درمان عفونت باکتریال ناحیه واژن؛ درمان بیماری التهابی لگن؛ درمان التهاب و زخم حاد لته؛ درمان عفونت های حاد دهانی؛ پیشگیری از عفونت های ناشی از جراحی؛ درمان آمیبیازیس روده ای تهاجمی؛ درمان آمیبیازیس خارج روده ای (شامل آبسه کبد)؛ درمان تریکومونیاژیس ادراری تناسلی؛ درمان ژیاودیازیس؛

نکاتی که باید قبل از مصرف مترونیدازول به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف مترونیدازول خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی مترونیدازول و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن، از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف مترونیدازول در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

مقدار زیادی از این دارو در شیر ترشح می شود، لذا در صورت مصرف مقدار زیاد دارو به صورت تک دوز، از شیردهی خودداری نمایید.

ث- مواردی را که قبل از مصرف مترونیدازول باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به بیماری های سیستم عصبی مرکزی هستید؛

- اگر دارای سابقه یا مبتلا به اختلالات خونی هستید؛

- اگر مبتلا به برفک دهانی (عفونت قارچی) هستید؛

- اگر به تازگی دوره درمان این دارو را کامل کرده اید؛

- اگر دچار بیماری های کبدی هستید؛

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛

- اگر در دوران شیردهی هستید؛

- تجویز در افراد مسن و نوزادان؛

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با مترونیدازول،

مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

باربیتوراتها، سایمتیدین، ضدانعقادها مثل وارفارین، دی سولفیرام، اتانول، هیدانتوئین ها مثل فنی توئین و لیتیم.

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول مترونیدازول چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- عفونت های بی هوازی

افراد ۱۲ تا ۱۷ سال: ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز (برای عفونت کلوستریدیوم دیفیسیل ۱۰ تا ۱۴ روز)

بزرگسالان: ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز (برای عفونت کلوستریدیوم دیفیسیل ۱۰ تا ۱۴ روز)

- در روش های درمانی چند دارویی جهت درمان زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکتر پیلوری همراه با کلاریترومایسین و مهار کننده های پمپ پروتون

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت

- در روش های درمانی چند دارویی جهت درمان زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکتر پیلوری همراه با آموکسی سیلین و امپرازول / لانسوپرازول

بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت

- فیستول بیماری کرون

بزرگسالان: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت معمولا به مدت یک ماه



Metronidazole

Scored F.C. Tablets 250 & 500 mg

- قرص را به طور کامل بلعیده و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری نمایید.
- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک، تجاوز ننمایید.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.
- این دارو ممکن است سبب سرگیجه شود لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهم ترین و شایع ترین عوارض دارویی مترونیدازول چیست؟
هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- خشکی دهان، درد عضلانی، تهوع، طعم بد دهان، استفراغ، ضعف عمومی، سردرد، کاهش تعداد گلبول‌های سفید، آنژیوادم، کاهش اشتها، عدم تعادل، گیجی، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، اختلالات گوارشی، حساسیت‌های پوستی و تیره شدن رنگ ادرار.

توجه: در صورت طولانی شدن دوره درمان بیش از ۱۰ روز بیمار باید از لحاظ بالینی و آزمایشگاهی پایش شود.

خ- مشخصات دارو:
هر جعبه مترونیدازول حاوی ۱۰۰ عدد (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) قرص روکشدار خطدار ۲۵۰ یا ۵۰۰ میلی گرمی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د- شرایط نگهداری مترونیدازول چیست؟
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: www.dorsadarou.com
رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com
Des.Lef.Metr/99.09/00

- زخم پا و زخم بستر
۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز

- عفونت باکتریال ناحیه واژن
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۵ تا ۷ روز یا ۲ گرم به صورت تک دوز

- بیماری التهابی لگن
۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۴ روز

- التهاب و زخم حاد لثه
افراد ۱۰ تا ۱۷ سال: ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۳ روز
بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۳ روز

- عفونت‌های حاد دهانی
افراد ۱۰ تا ۱۷ سال: ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۳ تا ۷ روز
بزرگسالان: ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۳ تا ۷ روز

- پیشگیری از عفونت‌های ناشی از جراحی
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم دو ساعت قبل از جراحی تجویز شود سپس در صورت لزوم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت تا ۳ دوز

- آمیبیازیس روده‌ای / آمیبیازیس خارج روده‌ای (شامل آبسه کبد)
افراد ۷ تا ۹ سال: ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز در عفونت روده‌ای و به مدت ۵ تا ۱۰ روز در عفونت خارج روده‌ای

افراد ۱۰ تا ۱۷ سال و بزرگسالان: ۸۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز در عفونت روده‌ای و به مدت ۵ تا ۱۰ روز در عفونت خارج روده‌ای

- تریکومونیازیس ادراری تناسلی
افراد ۱۰ تا ۱۷ سال و بزرگسالان: ۲۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز یا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۵ تا ۷ روز یا ۲ گرم به صورت تک دوز

- ژناریازیس
افراد ۳ تا ۶ سال: ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم هر ۲۴ ساعت به مدت ۳ روز
افراد ۷ تا ۹ سال: ۱ گرم هر ۲۴ ساعت به مدت ۳ روز

افراد ۱۰ تا ۱۷ سال و بزرگسالان: ۲ گرم هر ۲۴ ساعت به مدت ۳ روز
یا ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت به مدت ۵ روز یا ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۷ تا ۱۰ روز

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف مترونیدازول چیست؟
- حداقل به مدت یک روز قبل و بعد از مصرف این دارو از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل خودداری کنید.

- دارو را همراه با بلافاصله بعد از غذا، با یک لیوان پر از آب میل نمایید.