

گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی‌باشد، منافع و مضرات احتمالی ناشی از استفاده از این دارو در دوران شیردهی باید در نظر گرفته شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی آسمونت® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر حساسیت به آسپرین دارید،
- اگر مبتلا به فنیل کتونوری می‌باشید،
- اگر مبتلا به آسم حاد می‌باشید،
- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
- اگر در دوران شیردهی می‌باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی آسمونت® مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- فنوباریتال، ریفامپین.

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول داروی آسمونت® چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

توجه: در صورت بروز هرگونه تغییرات در خلق و رفتار متعاقب مصرف این دارو به بیماران توصیه می‌شود از ادامه مصرف آن خودداری نموده و به پزشک خود اطلاع دهند.

- پیشگیری و درمان آسم مزمن:

در کودکان ۱۴-۶ سال به میزان ۵ میلی‌گرم تک دوز هنگام سر شب و کودکان ۱۲ ماه تا ۵ سال به میزان ۴ میلی‌گرم تک دوز هنگام سر شب تجویز می‌شود.

در بزرگسالان به میزان ۱۰ میلی‌گرم تک دوز هنگام سر شب تجویز می‌شود.

- پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش:

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

هشدار: بروز عوارض عصبی‌روانی جدی شامل پرخاشگری، افسردگی، لکنت زبان، اختلالات خواب، وسواس فکری-عملی، افکار خودکشی و یا اقدام به آن، متعاقب مصرف فرآورده مونت‌لوکاست در بزرگسالان، نوجوانان و کودکان گزارش گردیده است لذا توصیه می‌گردد منافع و مضرات احتمالی هنگام تجویز این فرآورده و یا ادامه درمان با آن به ویژه در شرایطی که درمان‌های جایگزین موثر وجود دارد، در نظر گرفته شود. همچنین به بیماران توصیه می‌شود در صورت هرگونه تغییرات رفتاری و بروز علائم فوق از مصرف این دارو خودداری نموده و به پزشک خود اطلاع دهند.

الف- داروی آسمونت® چگونه اثر می‌کند؟

- آسمونت® از دسته آنتاگونیست انتخابی گیرنده لکوترین می‌باشد که برونکواسپاسم ناشی از حضور آنتی‌ژن را مهار می‌نماید.

ب- داروی آسمونت® در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- آسمونت® جهت پیشگیری و درمان آسم مزمن، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش، درمان رینیت آلرژیک فصلی و یا دائمی تجویز می‌گردد.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی آسمونت® به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی آسمونت® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی مونت‌لوکاست و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن، از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه: قرص جویدنی آسمونت® ۵ حاوی ۱/۱۲ میلی‌گرم فنیل آلانین می‌باشد، لذا مصرف آن در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری ممنوع است.

ت- ملاحظات مصرف داروی آسمونت® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام

Asmont® Montelukast (Chewable Tablets 5mg & F.C. Tablets 10mg)

چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

هشدار: در صورت بروز عوارض عصبی-روانی جدی شامل پرخاشگری، لکنت زبان، افسردگی، اختلالات خواب، وسواس فکری-عملی، افکار خودکشی و یا اقدام به آن، از ادامه مصرف دارو خودداری نموده و پزشک خود را مطلع نمایید.

- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شیوع کم: افزایش بدون علامت آنزیم‌های عملکرد کبدی (ALT/AST).

نادر: وجود علائم عفونت در ادرار.

- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: سردرد.

شیوع کم: دردهای شکمی، احساس کوفتگی، سرفه، دندان درد، اختلال در تعادل، سوء هاضمه، تب، التهاب معده و روده، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، گرفتگی بینی، علائم شبه آنفلوآنزا، راش پوستی، بی‌قراری، واکنش‌های حساسیتی (ورم صورت، لب‌ها، زبان و گلو)، کهیر و خارش، کابوس‌های شبانه، کبودی، اسهال، خواب‌آلودگی، توهم، هیپاتیت، التهاب پانکراس، زود رنجی، درد مفاصل و ماهیچه‌ها، تهوع و استفراغ، تپش قلب، احساس کرختی و سوزن سوزن شدن پاها و دست‌ها، تشنج و اختلال در خواب.

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه آسمونت® ۵ حاوی ۳۰ عدد (سه بلیستر ۱۰ عددی) قرص جویدنی ۵ میلی‌گرمی و هر جعبه آسمونت® ۱۰ حاوی ۳۰ عدد (سه بلیستر ۱۰ عددی) قرص روکشدار ۱۰ میلی‌گرمی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د - شرایط نگهداری داروی آسمونت® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: www.dorsadarou.com

ایمانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Mon/99/07/01

در افراد بالای ۱۵ سال به میزان ۱۰ میلی‌گرم تک دوز ۲ ساعت قبل از انجام ورزش تجویز می‌شود.

توجه: لازم به ذکر است در بیمارانی که از این دارو به عنوان درمان و پیشگیری از آسم مزمن استفاده می‌کنند مصرف دوز اضافی جهت پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش توصیه نمی‌شود.

- درمان رینیت آلرژیک فصلی:

در کودکان ۶-۱۴ سال به میزان ۵ میلی‌گرم تک دوز و در کودکان ۲-۵ سال به میزان ۴ میلی‌گرم تک دوز تجویز می‌شود.

در بزرگسالان به میزان ۱۰ میلی‌گرم تک دوز تجویز می‌شود.

- درمان رینیت آلرژیک دائمی:

در کودکان ۶-۱۴ سال به میزان ۵ میلی‌گرم تک دوز و در کودکان ۶ ماه تا ۵ سال به میزان ۴ میلی‌گرم تک دوز تجویز می‌شود.

در بزرگسالان به میزان ۱۰ میلی‌گرم تک دوز تجویز می‌شود.

توجه: جهت درمان به بیمارانی که همزمان دچار آسم و رینیت می‌باشند، مصرف یک قرص به صورت تک دوز در سر شب توصیه می‌گردد.

توجه: سلامتی و اثر بخشی مصرف این دارو برای پیشگیری و درمان برونکواسپاسم ناشی از ورزش در افراد کمتر از ۱۵ سال، جهت پیشگیری و درمان آسم در کودکان زیر ۱۲ ماه و همچنین برای بهبود علائم رینیت آلرژیک فصلی در کودکان زیر ۲ سال و بهبود علائم رینیت آلرژیک دائمی در کودکان زیر ۶ ماه ثابت نشده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی آسمونت® چیست؟

- این دارو را می‌توان با معده خالی یا همراه غذا مصرف نمود.

- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک، تجاوز ننمایید.

- آسمونت® ۵ حاوی قرص جویدنی ۵ میلی‌گرمی می‌باشد بنابراین باید قرص‌ها ابتدا جویده و یا خرد شده، سپس بلعیده شوند.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهم‌ترین و شایع‌ترین عوارض دارویی فرآورده آسمونت®