

سیلدنافیل و تادالافیل در بیماران مصرف کننده سایر نیترات های ارگانیک (چه به صورت منظم یا متناوب) تا ۴۸ ساعت بعد از مصرف این داروها ممنوع است.

ت - ملاحظات مصرف قرص دروکانتین® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟
- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

- مصرف در شیردهی:
از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد، منافع و مضار احتمالی ناشی از استفاده از این دارو در دوران شیردهی باید در نظر گرفته شود.

ث - مواردی را که قبل از مصرف قرص دروکانتین® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به کم خونی شدید می باشید،
- اگر مبتلا به نارسایی شدید کلیوی و یا کبدی می باشید،
- اگر دچار ضربه اخیر به سر و خونریزی مغزی شده اید،
- اگر پرتحرکی دستگاه گوارش و سندرم سوء جذب دارید،
- اگر مبتلا به هیپرتیروئیدی می باشید،
- اگر مبتلا به گلوکوم (افزایش فشار داخلی چشم) می باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.
ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با قرص دروکانتین®، مطلع کردن پزشک مهم است؟
لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف فرآورده های حاوی الکل،
- داروهای پایین آورنده فشارخون و یا داروهای

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.
چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - قرص دروکانتین® چگونه اثر می کند؟
- دروکانتین® با متعادل کردن حجم خون وارد شده به قلب باعث کاهش اکسیژن مورد نیاز عضله قلبی می گردد و همچنین از طریق گشاد کردن عروق به ویژه وریدها و توزیع مجدد و مؤثرتر جریان خون در قلب، میزان اکسیژن رسانی به قلب را افزایش داده و نسبت متعادلی از نیاز به اکسیژن و عملکرد قلبی ایجاد می کند.
ب - قرص دروکانتین® در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- دروکانتین® جهت پیشگیری از بروز حملات آنژین صدری و درمان طولانی مدت آنژین صدری مزمن و نارسایی بطن چپ تجویز می شود.

توجه: مصرف این دارو در شرایط بروز حملات آنژین صدری حاد توصیه نمی گردد و ضروری است از شکل های دارویی سریع الاثر دارو نظیر شکل دارویی زیربانی نیتروگلیسرین استفاده شود.

نکاتی که باید قبل از مصرف قرص دروکانتین® به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف قرص دروکانتین® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی نیتروگلیسرین و سایر نیترات ها از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

- مصرف این دارو به استثناء شرایط خاص همزمان در بیماران مبتلا به کم خونی شدید، افزایش فشار داخل جمجمه ای (خونریزی مغزی و یا آسیب به سر)، گلوکوم (افزایش فشار داخلی چشم)، افت فشار خون وضعیتی، نارسایی شدید کبدی، هیپرتیروئیدی، انفارکتوس حاد قلبی (شروع حمله قلبی)، نارسایی شدید کلیوی، پرتحرکی دستگاه گوارش، سندرم سوء جذب و همچنین مصرف همزمان با داروهای موثر در ناتوانی جنسی نظیر سیلدنافیل و تادالافیل منع مصرف دارد.

توجه: مصرف داروهای موثر در ناتوانی جنسی نظیر

Dorocontin® Nitroglycerin ER Tablets 2.6 & 6.4mg

زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی دروکانتین® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر با هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

۱- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:
شیوع کم: تاری دید، خشکی دهان، سردرد شدید و طولانی، راش‌های پوستی.

۲- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: گرگرفتگی صورت و گردن (وابسته به دوز)، سردرد، تهوع و استفراغ، افت فشار خون وضعیتی (احساس عدم تعادل و سبکی سر به ویژه هنگام تغییر وضعیت از حالت خوابیده یا نشسته به ایستاده)، بی‌قراری، افزایش ضربان.

خ- مشخصات دارو:

- **جعبه‌های ۱۰۰ عددی:** حاوی ۱۰۰ عدد (۱۰ بلیستر آلومینیومی ۱۰ عددی) **قرص دروکانتین®** پیوسته‌رهش ۲/۶ و یا ۶/۴ میلی‌گرمی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو در هر جعبه

- **قوطی پلاستیکی ۵۰ عددی:** حاوی ۵۰ عدد **قرص دروکانتین®** پیوسته‌رهش ۲/۶ و یا ۶/۴ میلی‌گرمی در قوطی پلاستیکی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو در هر جعبه

د- شرایط نگهداری دروکانتین® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: www.dorsadarou.com
رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com
Des.Lef.Dor/95.12/01

گشادکننده عروق،

- سیلدنافیل و تادالافیل،

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول دروکانتین® چیست؟
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دوز بزرگسالان:

- در درمان آئزین صدی پایدار مزمن و نارسایی مزمن قلبی دوز اولیه برای شروع درمان بسته به نیاز و تحمل بیمار از ۶/۴-۲/۶ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت تجویز می‌گردد، سپس در صورت احتیاج می‌توان دارو را هر ۸ ساعت تجویز نمود.

توجه: از آنجایی که مصرف طولانی مدت نیترات‌ها باعث ایجاد تحمل دارویی در بیمار می‌گردد، لذا توصیه می‌شود جهت جلوگیری از بروز این عارضه بیمار در فواصلی به مدت حداقل ۱۲-۸ ساعت در روز دارو را دریافت نکند.

توجه: از قطع مصرف ناگهانی به ویژه در بیمارانی که طولانی مدت و یا دوزهای بالای دارو را دریافت نموده‌اند، خودداری نمایید.

توجه: سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان ثابت نشده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف دروکانتین® چیست؟

- این دارو را باید با معده خالی به همراه یک لیوان آب مصرف نمایید و همچنین از خورد کردن و جویدن آنها خودداری نمایید.

- از آنجایی که مصرف دوز بالای نیترات‌ها ممکن است باعث بروز سردرد در بیماران گردد، برای بهبود آن در صورت امکان کاهش دوز مصرفی و یا مصرف مسکن‌ها (استامینوفن) توصیه می‌شود.

- از مصرف بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک جدا خودداری نمایید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموشی کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً