

## امپرازول

کپسول (انتریک کوتد) ۲۰ میلی گرمی

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

### الف - داروی امپرازول چگونه اثر می کند؟

امپرازول مهارکننده انتخابی و برگشت ناپذیر پمپ پروتون می باشد که باعث کاهش ترشح اسید در معده می گردد.

### ب - داروی امپرازول در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

درمان کوتاه مدت زخم های ایجاد شده در مری بر اثر برگشت اسید معده به مری،

درمان نگهدارنده و پیشگیرانه طولانی مدت در التهاب مری در حال بهبود در بیماران مبتلا به برگشت اسید معده به مری،

درمان زخم معده و زخم دوازدهه به تنهایی یا همراه با داروهای ضد هلیکوباکتر پیلوری،

پیشگیری از ایجاد زخم های گوارشی بر اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر آسپرین و ناپروکسن،

درمان بلند مدت ترشح بیش از حد اسید معده در شرایط بیماری زا نظیر بیماری سندرم زولینگر-الیسون.

### نکاتی که باید قبل از مصرف داروی امپرازول به آنها توجه نمود:

#### پ - در چه مواردی باید از مصرف داروی امپرازول خودداری کرد؟

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی امپرازول از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

#### ت - ملاحظات مصرف داروی امپرازول در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

#### - مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

#### - مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

#### ث - مواردی را که قبل از مصرف داروی امپرازول باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر دچار کمبود ویتامین B12 و یا منیزیم خون می باشید،

- اگر مبتلا به بیماری لوپوس پوستی یا منتشر می باشید،

- اگر مستعد بیماری پوکی استخوان می باشید،

- اگر مبتلا به بیماری های کبدی و کلیوی می باشید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می باشید،

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی امپرازول، مطلع کردن پزشک مهم است؟

## Omeprazole Capsules (E.C.) 20mg

است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.  
**در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟**

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.  
**ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی امپرازول چیست؟**

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

### شایع:

دردهای شکمی، یبوست، اسهال، سرگیجه، خشکی دهان، سردرد، اختلالات خواب، حساسیت پوستی، تهوع و استفراغ.

### شیوع کم و نادر:

پرخاشگری و پریشانگی، برونکواسپاسم، انسفالوپاتی، کاندیدیازیس گوارشی، ضعف عضلانی.

### خ- مشخصات دارو:

هر جعبه امپرازول حاوی ۱۴ یا ۲۸ کپسول انتریک کوتد به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

### د- شرایط نگهداری داروی امپرازول چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.  
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: [www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)  
رایانامه جهت ارتباط مشتری: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)  
Des.Lef.Omp/00.07/01

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- تاکرولیموس و متوتروکسات، دیگوکسین و کلوپیدوگرل، کتوکونازول، وارفارین، ریفامپین، دیازپام و داروهایی حاوی نمک‌های آهن.

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

### چ- مقدار مصرف معمول داروی امپرازول چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

جهت درمان و یا پیشگیری از عود مجدد زخم دوازدهه و معده روزانه یک عدد به مدت ۲ تا ۴ هفته. جهت درمان زخم معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری از رژیم درمانی همراه با آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده می‌شود.

جهت درمان زخم معده ناشی از مسکن‌ها روزانه یک عدد به مدت ۲ هفته استفاده می‌شود.

### نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی امپرازول چیست؟

- دارو را حداقل یک ساعت قبل از غذا میل کنید.  
- دارو را به طور کامل بلعیده و از خرد کردن، جویدن و باز کردن آن خودداری نمایید.  
- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را قطع نکنید.

### در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده