

دمیدور

اندانسترون (قرص روکشدار خط‌دار ۴ میلی‌گرم)

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - دمیدور چگونه اثر می‌کند؟

- **دمیدور** (اندانسترون) یک آنتاگونیست اختصاصی گیرنده $5-HT_3$ است که این گیرنده‌ها را در لوله گوارشی و سیستم اعصاب مرکزی مسدود می‌کند.

ب - دمیدور در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از رژیم‌های شیمی درمانی تهوع زا (متوسط تا شدید)؛

- جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از پرتودرمانی؛

- جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی؛

نکاتی که باید قبل از مصرف دمیدور به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف دمیدور خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی اندانسترون و یا سایر اجزای متشکله دارو؛

- در صورت ابتلا به سندرم QT طولانی مادرزادی؛

از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - ملاحظات مصرف دمیدور در دوران بارداری و

شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

- سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را

در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر

سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی تنها در حالتی مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.

ث - مواردی را که قبل از مصرف دمیدور باید به پزشک

خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر سابقه عمل جراحی لوزه دارید؛

- اگر مبتلا به انسداد تحت حاد روده‌ای هستید؛

- اگر احتمال ابتلا به آریتمی‌های قلبی دارید؛

- اگر مبتلا به اختلالات الکترولیتی هستید؛

- اگر دچار بیماری کبدی هستید؛

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛

- اگر در دوران شیردهی هستید؛

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با دمیدور،

مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون

نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا

دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین، فنوباریتال، فنی توئین

و پریمیدون؛

- آگونیست‌های رسپتورهای دوپامین مانند آپومورفین؛

- میتوتان؛

- ریفامپیسین؛

- سیس پلاتین، سیکلوفسفامید؛

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف



Demidor

Ondansetron (Scored F.C. Tablets 4 mg)

مصرف بعدی خودداری نمایید.
در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی دمیدور چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود؛ در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است، با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- شایع: یبوست، گرگرفتگی، سردرد و بدحالی؛
- غیر شایع: آریتمی، درد قفسه سینه، سکسکه، افت فشار خون، اختلالات حرکتی چشمی، تشنج؛
- نادر: سرگیجه، اختلالات قلبی و بینایی.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه دمیدور حاوی ۴۰ عدد قرص روکشدار خطدار (۲ بلیستر ۲۰ عددی) ۴ میلی‌گرمی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری دمیدور چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف داروهای که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی: customerservice@dorsadarou.com رایانامه جهت ارتباط مشتری:

Des.Lef.Ond/99.04/00

می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول دمیدور چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از رژیم‌های شیمی درمانی و یا پرتو درمانی با تهوع‌زایی متوسط:

بزرگسالان: مقدار اولیه ۸ میلی‌گرم ۱ تا ۲ ساعت قبل از شروع درمان تجویز می‌گردد، سپس به مقدار ۸ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت تا مدت ۵ روز ادامه می‌یابد.

- جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از رژیم‌های شیمی درمانی و یا پرتو درمانی با تهوع‌زایی شدید:

بزرگسالان: مقدار اولیه ۲۴ میلی‌گرم ۱ تا ۲ ساعت قبل از شروع درمان تجویز می‌گردد، سپس به مقدار ۸ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت تا مدت ۵ روز ادامه می‌یابد.

- جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی:

بزرگسالان: ۱۶ میلی‌گرم ۱ ساعت قبل از شروع بیهوشی تجویز می‌گردد.

توجه: حداکثر مقدار مصرف در بیماران مبتلا به اختلال متوسط تا شدید عملکرد کبدی ۸ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف دمیدور چیست؟

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک، تجاوز ننمایید.
در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار