

خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در زنان کاربردی ندارد.

ث- مواردی را که قبل از مصرف تامسولوسین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به بیماری کبدی می باشید،

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می باشید،

- اگر سابقه ابتلا به فشار خون پایین دارید،

- اگر در معرض عمل جراحی آب مروارید می باشید،

- اگر هر گونه آلرژی به سولفانامیدها دارید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با تامسولوسین، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف همزمان این دارو با سایمتیدین باید با احتیاط صورت گیرد زیرا کاهش کلیرانس و افزایش سطح زیر منحنی تامسولوسین ناشی از تجویز توام با سایمتیدین مشاهده می گردد.

- تداخل تامسولوسین با داروی وارفارین قطعی نیست ولی تجویز توام باید با احتیاط صورت گیرد.

- تداخلات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک دارویی بین تامسولوسین و سایر ترکیبات مسدود کننده آدرنژیک معین نشده است لذا نباید آنها را همراه یکدیگر استفاده کرد.

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- تامسولوسین چگونه اثر می کند؟

- تامسولوسین با مسدود کردن گیرنده های آلفا یک در عضلات صاف پروستات، سبب شل شدن عضله حلقوی دور مجرای پیشابراه شده و باعث تسهیل خروج ادرار می شود.

ب - تامسولوسین در چه مواردی استفاده می شود؟
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان علامتی بزرگی خوش خیم پروستات (BPH)
نکاتی که باید قبل از مصرف تامسولوسین به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف تامسولوسین خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی تامسولوسین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن و همچنین در بیماران با سابقه افت فشارخون وضعیتی و سنکوپ دفع ادرار از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف تامسولوسین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در

Tamsulosin

E.R. Capsules 0.4 mg

مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.
در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی تامسولوسین چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

سستی و ضعف، تاری دید، افسردگی، سرگیجه، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، اختلالات دستگاه گوارش، سردرد، واکنش‌های حساسیتی، افت فشار خون، ادم، طپش قلب، نعوظ دائم، خارش، راش، رینیت، سنکوپ، تاکی‌کاردی و اختلالات کبدی.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد کپسول پیوسته‌رهش **تامسولوسین ۰/۴** میلی‌گرمی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری تامسولوسین چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Tam/98.01/01

چ- مقدار مصرف معمول تامسولوسین چیست؟
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- بزرگسالان:

در درمان علائم و عوارض بزرگی خوش‌خیم پروستات (BPH)، مقدار ۰/۴ میلی‌گرم یک بار در روز و نیم ساعت بعد از وعده غذایی تجویز می‌گردد. در افرادی که پاسخ مناسبی به درمان با دوز یاد شده نداشته باشند، بعد از دو تا چهار هفته می‌توان دوز را تا ۰/۸ میلی‌گرم یک بار در روز افزایش داد.

در صورتی که وقفه‌ای به مدت چند روز در مصرف این دارو رخ دهد لازم است شروع مجدد درمان با مقدار ۰/۴ میلی‌گرم باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف تامسولوسین چیست؟

- دارو را به طور کامل بلعید و از باز کردن کپسول و له کردن آن در دهان خودداری کنید.

- این دارو را باید نیم ساعت پس از هر وعده غذایی مصرف نمود.

- بیمار را باید در خصوص احتمال بروز عوارض افت فشار خون وضعیتی مانند سرگیجه بدنال مصرف این دارو و احتیاط کامل در رانندگی، کار با ماشین آلات و انجام امور خطرناک مطلع ساخت.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از

