

بیس‌موسیت

بیس‌موت ساب‌سیترات (قرص روکشدار خط‌دار ۱۲۰ میلی‌گرم)

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- بیسموسیت چگونه اثر می‌کند؟

از عملکرد دقیق برخی نمک‌های بیسموت از جمله بیسموت ساب‌سیترات پتاسیم (بیسموسیت) در درمان عفونت‌های هلیکوباکتر پیلوری اطلاعات کافی در دسترس نمی‌باشد اما به نظر می‌رسد با تاثیر بر روی عملکرد غشاء دیواره سلولی و مهار سنتز پروتئین در باکتری، در درمان بیماری‌های گوارشی موثر می‌باشد.

ب- بیسموسیت در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان اختلالات گوارشی؛

- درمان زخم معده و دوازدهه؛

- درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری؛

نکاتی که باید قبل از مصرف بیسموسیت به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف بیسموسیت خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی بیسموت ساب‌سیترات پتاسیم و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن؛
- مبتلایان به نارسایی کلیوی متوسط تا شدید؛
- خانم‌های باردار؛

از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف بیسموسیت در دوران بارداری و

شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر اثرات دارو در دوران بارداری در دسترس نمی‌باشد، مصرف آن در این دوران توصیه نمی‌شود.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف بیسموسیت باید به

پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی می‌باشید؛

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می‌باشید؛

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛

- اگر در دوران شیردهی هستید؛

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با بیسموسیت،

مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

نمک‌های بیسموت خوراکی موجب افزایش PH معده و کاهش جذب تتراسایکلین‌ها می‌شوند. این تداخل را می‌توان با جدا کردن مصرف دو دارو در طی چند ساعت به حداقل رساند. به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول بیسموسیت چیست؟

Bismocit

Bismocit Subcitrate (Scored F.C Tablets 120 mg)

در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

از عوارض جانبی بیسموت سابسیترات پتاسیم می‌توان به تیرگی یا سیاه شدن مدفوع و زبان (موقتی و بی‌ضرر) اشاره کرد. بیسموت سابسیترات پتاسیم در صورت استفاده برای مدت زمان محدود سمیت خاصی ندارد. با این حال، دوز بیش از حد یا مصرف طولانی مدت ممکن است علائم مسمومیت با بیسموت را ایجاد کند و به همین دلیل درمان سیستمیک طولانی مدت توصیه نمی‌شود. اثرات مسمومیت حاد بیسموت شامل اختلالات دستگاه گوارش، واکنش‌های پوستی، استوماتیت و تغییر رنگ غشاهای مخاطی، نارسایی کلیوی و آسیب کبدی می‌باشد.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه بیسموسیت حاوی ۴۰ عدد قرص روکشدار خطدار (۴ بلیستر ۱۰ عددی) ۱۲۰ میلی‌گرمی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری بیسموسیت چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: WWW.dorsadarou.com
رایانامه جهت ارتباط با مشتری: customerservice@dorsadarou.com

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- درمان اختلالات گوارشی، زخم معده و در درمان چند دارویی زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکترپیلوری:

دو عدد نیم ساعت قبل از صبحانه و دو عدد نیم ساعت قبل از شام (با معده خالی) و یا یک عدد قبل از هر وعده غذایی (صبح، ظهر، شب) و قبل از خواب، به مدت ۴ هفته تجویز می‌گردد و ممکن است در صورت لزوم تا ۸ هفته ادامه یابد. نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف بیسموسیت چیست؟

- قرص را با یک لیوان پر از آب، قبل از غذا و به طور کامل میل نموده و از جویدن و خرد کردن آن خودداری نمایید.
- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک، تجاوز ننمایید.
در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهم‌ترین و شایع‌ترین عوارض دارویی بیسموسیت چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض