

## کلردیازپوکساید

قرص روکشدار خط دار ۵ و ۱۰ میلی گرمی

خطرتری نیز برای جایگزینی وجود ندارد باید منافع استفاده از دارو در برابر احتمال بروز مضرات آن مد نظر قرار گیرد.

### مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

**ت- مواردی را که قبل از مصرف داروی کلردیازپوکساید باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟**

- اگر مبتلا به هرگونه بیماری مانند سایکوز، گلوکوم (آب سیاه چشم) و بیماری انسدادی مزمن ریوی می باشید،

- اگر به مدت طولانی (بیشتر از ۴ ماه) این دارو را مصرف می کنید،

- در صورتی که الکل مصرف می کنید،

- اگر مبتلا به افسردگی همراه با اضطراب هستید،

- اگر سابقه ابتلا به اختلالات تشنجی دارید،

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی، قلبی و کلیوی می باشید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می باشید،

- کودکان و افراد سالمند و ضعیف

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

**ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی کلردیازپوکساید مطلع کردن پزشک مهم است؟**

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (باربیتوراتها، نارتوتیکها)

- آنتی اسیدها، سایمتیدین،

- ضد بارداری های خوراکی،

- پروپوکسی فن،

- پروپونید،

- ریفامپین، ایزونیازید، کتوکونازول و ایتراکونازول

- تتوفیلین

- دیگوسین، متوپرولول، پروپرانولول

- لوودوپا، فلوکستین، والپروئیک اسید، فنی تونین، دی سولفیرام

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

**الف- داروی کلردیازپوکساید چگونه اثر می کند؟**

کلردیازپوکساید از گروه دارویی بنزودیازپین ها می باشد، که باعث تقویت اثرات نوروترانسمیتر GABA در سلول های عصبی می شود.

**ب- داروی کلردیازپوکساید در چه مواردی استفاده می شود؟**

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

کلردیازپوکساید جهت کنترل اختلالات اضطرابی و یا برای کاهش کوتاه مدت علائم اضطراب، نشانه های محرومیت در

الکلیسم حاد و به منظور پیشگیری از تشویش و اضطراب قبل از عمل جراحی تجویز می گردد.

**نکاتی که باید قبل از مصرف داروی کلردیازپوکساید به آنها توجه نمود:**

**پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی کلردیازپوکساید خودداری کرد؟**

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی کلردیازپوکساید و یا اجزای تشکیل دهنده آن و سایر

بنزودیازپین ها، بیماران مبتلا به سایکوز مزمن، دپرسیون تنفسی، گلوکوم (آب سیاه چشم) و بیش فعالی، تجویز به

تنهایی به منظور درمان وسواس، ترس، افسردگی و یا اضطراب ناشی از آن، مصرف همزمان با داروهای مهار کننده سیتوکروم

P450 3A همانند کتوکونازول و ایتراکونازول، از مصرف این دارو جدا خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

**ت- ملاحظات مصرف داروی کلردیازپوکساید در دوران بارداری و شیردهی چیست؟**

**مصرف در بارداری:**

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه D قرار داده است، بدین معنی که اطلاعات

بدست آمده از تحقیقات و یا گزارش هایی که پس از عرضه دارو به بازار مصرف منتشر شده است احتمال بروز خطر برای جنین

انسان را نشان داده است. بنابراین در شرایط ویژه که بیماری خطرناک و تهدید کننده زندگی وجود دارد و داروی کم



# Chlordiazepoxide

## Scored F.C. Tablets 5 & 10mg

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟  
در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی کلردیازپوکساید چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

فراموشی، اختلالات حرکتی و گیجی (به خصوص در سالمندان)، وابستگی، خواب آلودگی و احساس گیجی و سیاهی رفتن چشم در روز بعد، ضعف عضلانی، پرخاشگری.

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد قرص انتریک کتد کلردیازپوکساید ۵ و یا ۱۰ میلی گرمی (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د - شرایط نگهداری داروی کلردیازپوکساید چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده اند، خودداری نمایید.

جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ - مقدار مصرف معمول داروی کلردیازپوکساید چیست؟  
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان:

عوارض حاد محرومیت از الکل: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم روزانه و در صورت نیاز تکرار می شود (حداکثر ۳۰۰ میلی گرم روزانه)

اضطراب خفیف تا متوسط: ۵ یا ۱۰ میلی گرم، سه تا چهار بار در روز

اضطراب شدید: ۲۰ تا ۲۵ میلی گرم، سه تا چهار بار در روز پیشگیری از تشویش و اضطراب قبل از عمل جراحی:

روز قبل از عمل جراحی: ۵ یا ۱۰ میلی گرم سه تا چهار بار در روز کودکان ۶ سال به بالا:

اضطراب: دوز آغازین: ۵ میلی گرم، دو تا چهار بار در روز نحوه تنظیم دوز: در تعدادی از کودکان ممکن است به ۱۰ میلی گرم دو تا سه بار در روز افزایش یابد.

سالمندان و افراد ضعیف:

دوز معمول: ۵ میلی گرم، دو تا چهار بار در روز

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف کلردیازپوکساید چیست؟

- در افراد با مشکلات گوارشی می توان این دارو را به همراه غذا و یا آب مصرف نمود.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و یا سرگیجه شود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در طول درمان با این دارو، از مصرف الکل و سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی خودداری نمایید.

- از قطع ناگهانی دارو، در صورت مصرف طولانی مدت و یا با دوزهای بالا، بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

- داروهای آنتی اسید می توانند سرعت جذب این دارو را دستخوش تغییر نمایند، بنابراین لازم است در صورت مصرف داروهای آنتی اسید با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک، تجاوز ننمایید.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

[www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)

Des.Lef.Chl/97.02/00



[www.dorsapharma.com](http://www.dorsapharma.com)



[dorsadarou](https://www.instagram.com/dorsadarou)



021- 54612000



تهران-طرحت-محله تیموری-بلوار شهید صالحی  
نبش سه راه اکبری-برج فناوری شریف-طبقه هشتم