

سیپروفلوکساسین قرص روکشدار ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

هشدار: احتمال ایجاد عوارض جانبی جدی و غیر قابل جبران در سیستم‌های اسکلتی-عضلانی و اعصاب مرکزی متعاقب مصرف این دارو وجود دارد لذا تجویز این دارو در بیماران دارای سابقه التهاب و پارگی تاندون، نوروپاتی محیطی، میاستنی گراویس، افکار تمایل به خودکشی و روان پریش توصیه نمی‌گردد.

در صورت بروز عوارضی نظیر درد، تورم و اختلال در عملکرد تاندون‌ها، تشدید ضعف عضلانی، تشنج، توهم و هذیان بلافاصله مصرف دارو را قطع نموده و سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

الف - سیپروفلوکساسین چگونه اثر می‌کند؟

- سیپروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولون‌ها است که با جلوگیری از تکثیر DNA باکتری باعث مرگ آنها می‌شود.

ب - سیپروفلوکساسین در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

این دارو در درمان عفونت‌های مجاری تنفسی و ادراری، پوست و بافت‌های نرم، دهانه رحم، پروستات، سوزاک، استخوان، دستگاه گوارشی، فیستول ناشی از بیماری کرون، سیاه زخم، تب تیفوئیدی، پیشگیری از بروز عفونت در جراحی‌ها و موارد ثانویه مننژیت مننگوکوکی تجویز می‌گردد.

نکاتی که باید قبل از مصرف سیپروفلوکساسین به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف سیپروفلوکساسین خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی سیپروفلوکساسین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن و بیماران با سابقه التهاب و یا پارگی تاندون متعاقب مصرف سایر داروهای گروه کینولون‌ها و همچنین بیماران دریافت کننده داروهای ضد آریتمی طولانی کننده فاصله موج QT نظیر آمیودارون، از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - ملاحظات مصرف سیپروفلوکساسین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

- مصرف در شیردهی:

به علت احتمال بروز عوارض دارویی جدی برای شیرخواران، مصرف سیپروفلوکساسین در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث - مواردی را که قبل از مصرف سیپروفلوکساسین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی، قلبی و کلیوی می‌باشید،

- اگر سابقه انفارکتوس حاد قلبی را دارید،

- اگر فردی سالمند هستید،

- اگر مبتلا به صرع هستید،

- اگر سابقه پیوند قلب، کلیه و کبد را دارید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می‌باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با سیپروفلوکساسین، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم

- سوکرافیت، بیسموت ساب‌سالیسیلات

- سایمتیدین

- سیزاپراید

- دیدانوزین

- روی و املاح آهن، کلسیم و منیزیم

- مرفین

- نیتروفورانتوئین

- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر ایبوپروفن و دیکلوفناک

- پروبنسید



Ciprofloxacin

F.C. Tablets 250 & 500mg

- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه و گیجی گردد، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در طول درمان با این دارو، از قرار گرفتن به مدت طولانی در برابر نور خورشید خودداری نمایید.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نموده و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهم ترین و شایع ترین عوارض دارویی سیپروفلوکساسین چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- اسهال، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، دردهای شکمی، بی‌اشتهایی، اضطراب، سرگیجه، افسردگی، اختلال در بینایی و حس چشایی، اختلال در خواب، لرزش، اختلال در حس بویایی و چشایی، افت فشارخون و حساسیت به نور.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۲۰ عدد قرص روکشدار سیپروفلوکساسین ۲۵۰ یا ۵۰۰ میلی گرمی (۴ بلیستر ۵ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د- شرایط نگهداری سیپروفلوکساسین چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهای که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Cip/00.03/02

- آمودارون، دیسوپرامید، کینیدین، پروکائین آمید و سوتالول

- داروهای ضد انعقاد خوراکی نظیر وارفارین

- دیگوکسین

- اریتروماسین

- فنوتیازین

- ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای نظیر آمی‌تریپتیلین و نورتریپتیلین

- داروهای ضد دیابت سولفونیل اوره نظیر گلی‌بنکلامید

- کافئین

- تیوفیلین و تیزانیدین

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند. آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول سیپروفلوکساسین چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان:

- فیستول ناشی از بیماری کرون: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت،

- عفونت مجاری تنفسی: مقدار دارو ۷۵۰-۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت،

- عفونت پسودومونایی مجاری تنفسی تحتانی در فیبروز سیستیک: ۷۵۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت،

- عفونت مجاری ادراری: ۷۵۰-۲۵۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت

پروستاتیت حاد یا مزمن: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۲۸ روز،

- سوزاک: ۵۰۰ میلی‌گرم تک دوز،

- درمان سایر عفونت‌ها: ابتدا ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت و در صورت نیاز تا مقدار ۷۵۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت در روز افزایش می‌یابد.

- پیشگیری از بروز عفونت در جراحی‌ها: ۷۵۰ میلی‌گرم یک ساعت قبل از شروع جراحی،

- پیشگیری از بروز موارد ثانویه مننژیت مننکوکوک:

افراد بالای ۱۲ سال: ۵۰۰ میلی‌گرم تک دوز،

کودکان ۵ تا ۱۱ سال: ۲۵۰ میلی‌گرم تک دوز،

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف سیپروفلوکساسین چیست؟

- قرص را با یک لیوان پر از آب میل نموده و از جویدن آن خودداری نمایید.

- ۲ ساعت قبل و یا ۶ ساعت بعد از مصرف این دارو از مصرف شیر، آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم، سوکرافیت، فرآورده های حاوی آهن، روی و کلسیم خودداری نمایید.

