

## کلاریدر® ۲۵۰ و کلاریدر® ۵۰۰

کلاریترومایسین (قرص روکشدار خطدار)

مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

### - مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی به استثنای شرایط بالینی خاص که توسط پزشک متخصص تشخیص داده می‌شود، توصیه نمی‌گردد.

**ث- مواردی را که قبل از مصرف کلاریدر® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟**

- اگر مبتلا به بیماری‌های کبدی می‌باشد،

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می‌باشد،

- اگر مبتلا به بیماری‌های قلبی می‌باشد،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می‌باشد،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

**ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با کلاریدر®، مطلع کردن پزشک مهم است؟**

اطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون سخنه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نماید.

- آستمیزول

- سیزپراید

- پیموزاید

- ترفنادین

- ارگوتامین

- دی‌هیدروارگوتامین

- دیگوکسین

- امپرازول

- ریفامپین

- زیدوودین

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

**چ- مقدار مصرف معمول کلاریدر® چیست؟**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

**مقدار مصرف در بزرگسالان و نوجوانان:**

- در درمان برونشیت باکتریایی (ناشی از هموفیلوس انفلوآنزا):

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

**الف- کلاریدر® چگونه اثر می‌کند؟**

- کلاریدر® از دسته آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولیدی و از مشتقان اریترومایسین می‌باشد.

**ب- کلاریدر® در چه مواردی استفاده می‌شود؟**

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

این دارو در درمان بیماران مبتلا به عفونت‌های خفیف تا متوسط ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس به دارو در موارد ذیل تجویز می‌گردد:

- در درمان برونشیت مزمن باکتریایی (ناشی از هموفیلوس انفلوآنزا، هموفیلوس پارا انفلوآنزا و موراکسلا کاتارالیس)، ذات‌الریه اکتسابی از جامعه (ناشی از کلامیدیا پنومونیه، میکوپلاسم پنومونیه و استرپتوکک پنومونیه)، عفونت‌های پوستی و بافت‌های نرم بدون عارضه، فارنژیت (ناشی از استرپتوکک)، تانسیلیت، سینوزیت حاد باکتریایی، التهاب گوش میانی، در درمان چند دارویی زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکترپیلوری (بسته به نوع پروتکل درمانی چند دارویی) و در درمان و پیشگیری از بیماری کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم.

**نکاتی که باید قبل از مصرف کلاریدر به آنها توجه نمود:**

**پ- در چه مواردی باید از مصرف کلاریدر خودداری کرد؟**

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی کلاریترومایسین و سایر آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولیدی نظیر اریترومایسین از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

**توجه: مصرف همزمان کلاریدر (کلاریترومایسین) و داروهای آستمیزول، سیزپراید، پیموزاید، ترفنادین، ارگوتامین و دی‌هیدروارگوتامین منوع است.**

**ت- ملاحظات مصرف کلاریدر® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟**

**- مصرف در بارداری:**

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا



www.dorsapharma.com



dorsadarou



021-54612000



تهران

تهران- طرشت- محله تیموری- بلوار شهید صالحی

نشش سه راه اکبری- برج فناوری شریف- طبقه هشتم

## Claridor® 250 & Claridor® 500 Clarithromycin (F.C. Scored Tablets)

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**ح - مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی کلاریدر® چیست؟**  
هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضهای که در این برگه راهنمای ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

**- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:**

شیوع کم؛ سمتیت کبدی (تب، تهوع، استفراغ، زردی پوست و چشم‌ها)، واکنش‌های افزایش حساسیت (کوتاه شدن تنفس، راش‌های پوستی و خارش)، کولیت پسودومیران (حساسیت و درد شدید شکم، اسهال شدید آبکی و گاهی همراه با خون و تب)، ترومبوسیتوپنی (کبدی و خونریزی‌های غیر طبیعی).

**- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:**

شایع: احساس طعم غیر طبیعی در دهان، ناراحتی‌های گوارشی (دردهای شکمی، اسهال، تهوع و استفراغ) و سردرد.

**خ - مشخصات دارو:**

هر جعبه کلاریدر® ۲۵۰ و یا کلاریدر® ۵۰۰ حاوی ۳۰ عدد قرص روکشدار خطدار ۲۵۰ و یا ۵۰۰ میلی‌گرمی (بلیستر ۶ عددی) و هر جعبه سوسپانسیون کلاریدر® ۱۲۵ میلی‌گرم در هر ۵ میلی‌لیتر) و یا کلاریدر® ۲۵۰ (۲۵۰ میلی‌گرم در هر ۵ میلی‌لیتر) ۱۰۰ میلی‌لیتر سوسپانسیون خوراکی به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

**د - شرایط نگهداری کلاریدر® چیست؟**

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- پودر خشک برای تهیه سوسپانسیون را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. بعد از تهیه، سوسپانسیون آماده را در یخچال نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید و به مدت ۱۴ روز قابل مصرف می‌باشد.

- دارو را از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

سایت اینترنتی: [www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)  
رایانامه جهت ارتباط مشتری: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)  
Des.Lef.Cla/95.12/00

۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۷ تا ۱۴ روز، در درمان برونشیت باکتریایی (ناشی از پنومونی، کلامیدیا، میکوپلاسم و استرپتوک) و عفونت‌های پوستی و بافت‌های نرم بدون عارضه: ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۷-۱۴ روز، به عنوان پیشگیری در بیماری کمپلکس مایکروبکتریوم آویوم منتشر: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت و در درمان بیماری کمپلکس مایکروبکتریوم آویوم منتشر: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت به همراه سایر داروهای آنتی‌مایکروبکتریوم، در درمان فارنزیت (ناشی از استرپتوک): ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۰ روز، در درمان سینوزیت حاد باکتریایی: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۴ روز، در درمان چند دارویی زخم دوازدهه ناشی از هلیکوبکتریلوری: ۵۰۰ میلی‌گرم ۲-۳ بار در روز (بسته به نوع پروتکل درمانی چند دارویی) به مدت ۱۴ روز تجویز می‌گردد.

**مقدار مصرف در کودکان (پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی):**  
- مقدار مصرف در کودکان ۷/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (7/5mg/kg) هر ۱۲ ساعت (دو بار در روز) به مدت ۱۰ روز می‌باشد.

**توجه: حداقل دوز تجویزی در کودکان ۱۰۰۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.**

**نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف کلاریدر® چیست؟**  
- طرز تهیه سوسپانسیون: ابتدا بطری را تکان دهید تا ذرات پودر از هم باز شوند، سپس آب جوشیده سرد شده را در دو مرحله تا خط نشانه مشخص شده بر روی بدنه ظرف به پودر اضافه نموده و هر بار ظرف را به خوبی تکان دهید. قبل از هر بار مصرف ظرف را خوب تکان دهید و بیمانه را قبیل و بعد از مصرف بشویید. پس از هر بار مصرف در ظرف را محکم ببندید.

- فاصله مصرف کلاریدر® (کلاریترومایسین) با داروی زیدوودین باید حداقل ۴ ساعت باشد.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

**در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟**

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

**در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟**

