

- سابقه آسم، انقباض مجاری هوایی (به خصوص در افرادی که پولیپ بینی دارند)، کهیر، آنژیوادم و یا هرگونه واکنش آلرژیک پس از مصرف آسپرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی.

ت- ملاحظات مصرف درو فن® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف درو فن® در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف درو فن® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به بیماری‌های تنفسی و آسم می‌باشید.

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی و یا کبدی می‌باشید.

- اگر مبتلا به بیماری‌های قلبی و فشار خون بالا می‌باشید.

- اگر بیماری‌های گوارشی و یا سابقه خونریزی گوارشی دارید.

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با درو فن®، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف الکل و داروهای کاهش دهنده آنزیم‌های کبدی

- آسپرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (افزایش عوارض گوارشی).

- لیتیم (افزایش سطح سرمی لیتیم).

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- درو فن® چگونه اثر می‌کند؟

- درو فن® حاوی داروی ایبوپروفن به عنوان داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) و داروی استامینوفن می‌باشد. این داروها با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX) موجب کاهش تولید پروستاگلندین‌های التهابی می‌شوند و بنابراین اثرات تب بری، ضد دردی و ضد التهابی خود را اعمال می‌کند. همچنین درو فن® حاوی کافئین به عنوان داروی محرک ضعیف مغزی می‌باشد که باعث افزایش اثر ضد دردی درو فن® می‌گردد.

ب- درو فن® در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درو فن® به عنوان ضد تب و همچنین به منظور تسکین دردهای خفیف تا متوسط نظیر سردرد، دندان درد، دردهای قاعدگی و دردهای مفصلی ناشی از استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید تجویز می‌گردد.

نکاتی که باید قبل از مصرف درو فن® به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف درو فن® خودداری کرد؟

- حساسیت به استامینوفن، ایبوپروفن و کافئین.

Dorofen[®]

Acetaminophen325/ Caffeine40/
Ibuprofen200(Capsule)

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهمترین و شایعترین عوارض دارویی دروفن[®] چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- عوارض گوارشی (تهوع، استفراغ و اسهال)، اختلالات خونی، تنگی نفس، واکنش‌های حساسیتی پوستی (کهیر و راش پوستی)، آسیب‌های کلیوی و کبدی.

مصرف این دارو در هنگام خواب، ممکن است موجب بروز اشکال در خواب شود.

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه دروفن[®] حاوی ۲۰ عدد کپسول (۲ بلیستر ۱۰ عددی) و یا ۳۰ عدد کپسول (۳ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د - شرایط نگهداری دروفن[®] چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی: customerservice@dorsadarou.com

رایانامه جهت ارتباط مشتری: Des.Lef.Dorf/96.02/01

- داروهای ضد انعقاد خوراکی نظیر وارفارین (افزایش اثر ضدانعقادی آن می‌گردد).

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ - مقدار مصرف معمول دروفن[®] چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دوز بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال:

- یک یا دو کپسول هر ۶ ساعت تجویز می‌گردد.

توجه: حداکثر دوز تجویزی ۸ کپسول در روز می‌باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف دروفن[®] چیست؟

- از مصرف بیش از مقدار مجاز روزانه، خودداری نمایید.
- توصیه می‌شود در صورت عدم بهبودی پس از دو روز به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

