

امپاگلیفلوزین ۱۰/ لیناگلیپتین ۵ (قرص روکشدار ۵/۱۰ میلی گرم)
امپاگلیفلوزین ۲۵/ لیناگلیپتین ۵ (قرص روکشدار ۵/۲۵ میلی گرم)

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

هشدار: بروز کتواسیدوز دیابتی هنگام مصرف این دارو گزارش گردیده است لذا به بیماران توصیه می‌گردد در صورت ایجاد علائمی نظیر کاهش سریع وزن، تهوع و استفراغ، تنفس سریع و عمیق، خواب آلودگی، استشمام بوی شیرین از هوای بازدم، احساس طعم شیرین و فلزی در دهان و بوی متفاوت ادرار از مصرف این دارو خودداری نموده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید. قطع درمان با مهارکننده SGLT2 در بیمارانی که برای جراحی‌های مهم و یا بیماری‌های حاد در بیمارستان بستری می‌شوند تا زمانی که وضعیت بیمار تثبیت شود، الزامی می‌باشد. همچنین بروز گانگرن فورنیه و عفونت نکروزان بافت نرم هنگام مصرف این دارو گزارش گردیده است لذا به بیماران توصیه می‌گردد در صورت بروز درد شدید، حساسیت به لمس محل درد، قرمزی و تورم در ناحیه تناسلی به همراه تب و ضعف از مصرف این دارو خودداری نموده و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

الف - امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین چگونه اثر می‌کند؟

این فرآورده ترکیبی از دو داروی کنترل‌کننده قند خون می‌باشد.

- امپاگلیفلوزین از دسته داروهای مهارکننده باز جذب گلوکز - سدیم به شمار می‌رود که از طریق مهار باز جذب گلوکز در کلیه باعث کاهش قند خون می‌شود.

- لیناگلیپتین از دسته داروهای مهارکننده دی‌پپتیل پپتیداز تیپ چهار می‌باشد که سبب افزایش ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون می‌شود.

ب - امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- این فرآورده در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع ۲ که استفاده از سایر داروهای ضد دیابت به تنهایی سطح قند خون بیمار را به خوبی کنترل نکرده باشند، تجویز می‌شود.

نکاتی که باید قبل از مصرف امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی لیناگلیپتین و

امپاگلیفلوزین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن؛

- ابتلا به دیابت نوع یک و کتواسیدوز دیابتی (افزایش کتون‌ها در خون یا ادرار)؛

- در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۷۵ سال؛

- بیماری شدید کلیوی (در حال دیالیز)؛

از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - ملاحظات مصرف امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.

- مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

ث - مواردی را که قبل از مصرف امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر دچار اختلال عملکرد کلیوی و کبدی می‌باشید؛

- اگر مبتلا به بیماری پانکراتیت می‌باشید؛

- چنانچه عفونت قارچی دستگاه تناسلی دارید؛

- اگر عفونت مجاری ادراری یا مشکل در ادرار کردن دارید؛

- اگر افت فشار خون دارید؛

- اگر مبتلا به نارسایی قلبی می‌باشید؛

- اگر مبتلا به درد شدید مفاصل می‌باشید؛

- اگر داروهای کاهنده قند خون مصرف می‌کنید؛

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛

- اگر در دوران شیردهی می‌باشید؛

و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.



Empagliflozin 10/ Linagliptin 5 (F.C. Tablets 10/5 mg)
Empagliflozin 25/ Linagliptin 5 (F.C. Tablets 25/5 mg)

در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض شایع:

- التهاب پانکراس و درد حاد شکم، التهاب پوستی سر آلت تناسلی مردان، افت قند خون، افزایش احتمال عفونت، واکنش‌های پوستی، تشنگی، اختلالات و عفونت ادراری.

عوارض غیر شایع:

کاهش حجم مایعات بدن (هیپوولمی)، سرفه، التهاب مجاری بینی و حلق.

عوارض نادر:

کتواسیدوز دیابتی (کاهش سریع وزن، تهوع و استفراغ، تنفس سریع و عمیق، خواب آلودگی، استشمام بوی شیرین از هوای بازدم، احساس طعم شیرین و فلزی در دهان و بوی متفاوت ادرار)، گانگرن فورنیه و عفونت نکروزان بافت نرم (درد شدید، حساسیت به لمس محل درد، قرمزی و تورم در ناحیه تناسلی به همراه تب و ضعف) و ادم (تورم کبیر مانند) پوستی. توجه: در صورت بروز علائم حاد التهاب پانکراس (درد حاد و پایدار در ناحیه شکم) و یا مشاهده تاول‌های پوستی مصرف دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد (۳ بلیستر ۱۰ عددی) قرص روکشدار امپاگلیفلوزین ۱۰/لیناگلیپتین ۵ میلی گرمی و یا امپاگلیفلوزین ۲۵/لیناگلیپتین ۵ میلی گرمی به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د - شرایط نگهداری امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

ایرانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Emp/Lin/01.05/01

- انسولین یا سایر داروهای کاهنده قند خون؛

- دیورتیک‌ها (ادرار آورها)؛

- ریفامپین؛

- مصرف فرآورده‌های حاوی الکل؛

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

ج - مقدار مصرف معمول امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

برای درمان دیابت قندی نوع ۲:

- بزرگسالان (۲۴-۱۸ سال): مقدار شروع مصرف این دارو یک قرص امپاگلیفلوزین ۱۰/لیناگلیپتین ۵ میلی گرم یکبار در روز می‌باشد. در صورت لزوم به یک عدد قرص امپاگلیفلوزین ۲۵/لیناگلیپتین ۵ میلی گرم در روز افزایش می‌یابد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین چیست؟

- این دارو را می‌توان یکبار در روز صبح با غذا و یا بدون غذا مصرف نمود.
- در حین مصرف دارو رژیم غذایی را رعایت کرده و ورزش را ادامه دهید.
- در طول مصرف این دارو، قند خون خود را بصورت دوره‌ای کنترل کنید.
- با مصرف این دارو ممکن است در آزمایش ادرار، قند دیده شود.
- در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟
اگر بیش از ۱۲ ساعت از مصرف دارو گذشته، دوز فراموش شده را مصرف نکنید و دوز بعدی را در ساعت معمول خود مصرف نمایید و از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهمترین و شایعترین عوارض دارویی امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

