

- اگر مبتلا به بیماری‌های کبدی، کلیوی و پورفیری هستید،
- اگر دچار سوختگی شدید هستید،
- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
- اگر در دوران شیردهی می‌باشید،
و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.
ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با گلی بنکلامید مطلع کردن پزشک مهم است:
لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.
آندروژن‌ها، داروهای ضد انعقاد، ضد قارچ‌های آزولی نظیر فلوکونازول، باربیتورات‌ها، بتابلاکرها، مسددهای کانال کلسیمی، زغال فعال، کلرامفتیکل، کلستیرامین، سیپروفلوکساسین، کلوفیبرات، کورتیکوستروئیدها، دیازوکساید، استروژن‌ها، الکل، جمفیروزیل، آنتی‌هیستامین‌ها، فنتوتوئین، ایزونیاژید، نمک‌های منیزیم، متیل دوپا، ایزوکربوکسازید، سلژیلین، اسید نیکوتینیک، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین‌ها، پروپنسید، ریفامپین، سالیسیلات‌ها، سولفین پیرازون، سولفونامیدها، محرک‌های سمپاتیک، مدرهای تیازیدی، هورمون‌های تیروئیدی، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای، داروهای اسیدی کننده و یا قلبیایی کننده ادرار و دیگوکسین.
به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.
چ- مقدار مصرف معمول گلی بنکلامید چیست؟
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
- بزرگسالان: شروع درمان با مقدار اولیه ۵ میلی‌گرم یکبار در روز بلافاصله بعد از صرف صبحانه یا اولین وعده اصلی غذا آغاز می‌شود این مقدار براساس پاسخ درمانی بیمار می‌تواند تا حداکثر میلی‌گرم در روز افزایش پیدا نماید.

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.
چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.
الف- گلی بنکلامید چگونه اثر می‌کند؟
- گلی بنکلامید با افزایش آزادسازی انسولین از سلول‌های فعال بتای لوزالمعده موجب کاهش قند خون می‌شود.
ب- گلی بنکلامید در چه مواردی استفاده می‌شود؟
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.
- دیابت قندی نوع ۲
نکاتی که باید قبل از مصرف گلی بنکلامید به آنها توجه نمود:
پ- در چه مواردی باید از مصرف گلی بنکلامید خودداری کرد؟
- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی گلی بنکلامید و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.
ت- ملاحظات مصرف گلی بنکلامید در دوران بارداری و شیردهی چیست؟
- مصرف در بارداری:
سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.
- مصرف در شیردهی:
این دارو در مادرانی که در دوران شیردهی می‌باشند و پیش از این مبتلا به دیابت بوده‌اند می‌تواند مصرف شود.
ث- موارد احتیاط یا مواردی را که قبل از مصرف گلی بنکلامید باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟
- اگر سابقه اغمای دیابتی و یا کتواسیدوز دارید،
- اگر فردی سالمند هستید،

Glibenclamide

Scored Tablets 5mg

تاری دید، زردی، هپاتیت، راش، واکنش‌های حساسیتی پوستی
سوزش سردل، حالت تهوع، استفراغ، اسهال، تب، کاهش قند خون.
خ- مشخصات دارو
هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد قرص خط دار گلی‌بنکلامید ۵ میلی‌گرمی
۱۰ بلیستر (۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.
د- شرایط نگهداری گلی‌بنکلامید چیست؟
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و
رطوبت و در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری
نمایید.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف گلی‌بنکلامید چیست؟
- این دارو را باید بلافاصله بعد از صرف صبحانه یا اولین وعده اصلی میل نمایید.
- به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب‌آلودگی، و گیجی، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید با احتیاط مصرف شود.
- بدون تجویز پزشک از مصرف سایر داروها همزمان با این دارو خودداری نمایید.
- از قرار گرفتن به مدت طولانی در برابر نور خورشید خودداری نمایید.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایع‌ترین عوارض دارویی گلی‌بنکلامید چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

www.dorsadarou.com
customerservice@dorsadarou.com
Des.Lef.Gli/9606/00

سایت اینترنتی:
رایانامه جهت ارتباط مشتری:



www.dorsapharma.com



[dorsadarou](https://www.instagram.com/dorsadarou)



021- 54612000



تهران-طرشت-محله تیموری-بلوار شهید صالحی
نبش سه راه اکبری-برج فناوری شریف-طبقه هشتم