

کنون وجود ندارد، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.
ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی لنسیدر® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر دچار کمبود ویتامین B12 و یا منیزیم خون می‌باشید،
 - اگر مبتلا به بیماری لوپوس پوستی یا منتشر می‌باشید،
 - اگر مستعد بیماری پوکی استخوان می‌باشید،
 - اگر مبتلا به بیماری‌های کبدی می‌باشید،
 - اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می‌باشید،
 - اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
 - اگر در دوران شیردهی می‌باشید،
- و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی لنسیدر®، مطلع کردن پزشک مهم است؟

- لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.
- تاکرولیموس و متوترکسات
 - دیگوکسین و کلوییدوگرل
 - کتوکونازول
 - وارفارین
 - تتوفیلین
 - مایکوفنولات مفتحیل

- داروهایی حاوی نمک‌های آهن
به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول داروی لنسیدر® چیست؟
مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

دوز بزرگسالان:

- در درمان برگشت اسید معده به مری ۱۵ میلی‌گرم یکبار در روز و در درمان ازوفازیت اروزو ۳۰ میلی‌گرم یکبار در روز به مدت ۸ هفته (در صورت عدم بهبودی تکرار یک دوره ۸ هفته‌ای دیگر توصیه می‌شود و برای پیشگیری و یا جلوگیری از عود مجدد ازوفازیت اروزو ممکن است سه دوره ۸ هفته‌ای در نظر گرفته شود) دوز نگهدارنده در بیماران نیازمند، ۱۵ میلی‌گرم

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.
چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی لنسیدر® چگونه اثر می‌کند؟

- لنسیدر® مهارکننده انتخابی و برگشت ناپذیر پمپ پروتون می‌باشد که باعث کاهش ترشح اسید در معده می‌گردد.

ب- داروی لنسیدر® در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان کوتاه مدت زخم‌های ایجاد شده در مری بر اثر برگشت اسید معده به مری،

- درمان نگهدارنده و پیشگیرانه در التهاب مری در حال بهبود در بیماران مبتلا به برگشت اسید معده به مری،

- درمان زخم معده و زخم دوازدهه به تنهایی یا همراه با داروهای ضد هلیکوباکتر پیلوری،

- پیشگیری از ایجاد زخم‌های گوارشی بر اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر آسپرین و ناپروکسن،

- درمان بلند مدت ترشح بیش از حد اسید معده در شرایط بیماری‌زا نظیر بیماری سندرم زولینگر-الیسون.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی لنسیدر® به آنها توجه نمود:
پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی لنسیدر® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی لانسوپرازول و سایر داروهای مهارکننده پمپ پروتون نظیر امپرازول از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف داروی لنسیدر® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که شواهدی مبتنی بر ترشح این دارو در شیر مادر تا

Lansidor® Lansoprazole Capsules (E.C.) 15 & 30mg

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.
ح- مهمترین و شایع ترین عوارض دارویی لنسیدر® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:
شایع:

اسهال، راش‌های پوستی و یا خارش.

شیوع کم:

دردهای شکمی، درد مفاصل، افزایش و یا کاهش اشتها، تهوع و استفراغ.

نادر:

بی‌قراری، یبوست، علائم شبه آنفلوآنزا، سرفه، افسردگی، درد عضلانی، ترومبوسیتوپنی، نفريت بینابینی حاد، التهاب و یا عفونت مجاری فوقانی تنفسی.

- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:
شایع:

سرگیجه و سردرد.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه لنسیدر® ۱۵ و یا لنسیدر® ۳۰ حاوی ۳۰ کپسول انتریک‌کوتد (۳ بلیستر ۱۰ عددی) لانسوپرازول ۱۵ و یا ۳۰ میلی‌گرمی به همراه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری داروی لنسیدر® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی: customerservice@dorsadarou.com

رایانامه جهت ارتباط مشتری: Des.Lef.Lan/95.12/00

یکبار در روز تجویز می‌گردد.
- در درمان زخم معده ۳۰-۱۵ میلی‌گرم یکبار در روز ترجیحاً قبل از صرف صبحانه به مدت ۸ هفته تجویز می‌گردد.

- در درمان زخم دوازدهه ۳۰-۱۵ میلی‌گرم یکبار در روز ترجیحاً قبل از صرف صبحانه به مدت ۴ هفته تجویز می‌گردد. در بیمارانی که نیازمند به دوز نگهدارنده می‌باشند ۱۵ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد. حداکثر دوز تجویزی در درمان زخم معده و دوازدهه ۳۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

- در درمان زخم دوازدهه ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در رژیم‌های درمانی سه تایی (به همراه آموکسی‌سیلین و کلاریترومایسین) به میزان ۳۰ میلی‌گرم دو بار در روز قبل از صرف غذا به مدت ۱۴-۱۰ روز تجویز می‌گردد.

- درمان در سندرم زولینگر-الیسون با دوز اولیه ۶۰ میلی‌گرم یکبار در روز ترجیحاً قبل از صرف صبحانه آغاز می‌گردد و با توجه به پاسخ درمانی بیمار ممکن است مصرف آن تا ۹۰ میلی‌گرم دو بار در روز به مدت طولانی (۴ سال) ادامه پیدا کند. همچنین توصیه می‌گردد مصرف دوزهای بالاتر از ۱۲۰ میلی‌گرم در روز در دوزهای منقسم باشد.

توجه: حداکثر دوز تجویزی در درمان سندرم زولینگر-الیسون ۱۸۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

توجه: حداکثر دوز تجویزی در سالمندان ۳۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی لنسیدر® چیست؟

- دارو را قبل از غذا میل کنید.

- دارو را به طور کامل بلعیده و از خرد کردن، جویدن و باز کردن آن خودداری نمایید.

- در صورت عدم توانایی بیمار در بلعیدن این دارو، می‌توان محتویات داخل کپسول را خالی کرده و بلافاصله به همراه نوشیدنی بلعید و توصیه می‌گردد از جویدن محتویات داخل کپسول نیز خودداری گردد.

- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را قطع نکنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

