

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- لووفلوکساسین چگونه اثر می کند؟

- لووفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولون ها است که با جلوگیری از تکثیر DNA باکتری باعث مرگ آنها می شود.

ب - لووفلوکساسین در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید. این دارو در درمان عفونت های مجاری ادراری، پوست و بافت های نرم، سینوزیت حاد و مزمن، برونشیت مزمن، پنومونی، پروستات و سیاه زخم تجویز می گردد.

نکاتی که باید قبل از مصرف لووفلوکساسین به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف لووفلوکساسین خودداری کرد؟
- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی لووفلوکساسین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن و بیماران با سابقه التهاب و یا پارگی تاندون متعاقب مصرف سایر داروهای گروه کینولون ها و همچنین بیماران دریافت کننده داروهای ضد آریتمی طولانی کننده فاصله موج QT نظیر آمیودارون، از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف لووفلوکساسین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی بارداری از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن برتر باشد.

- مصرف در شیردهی:

به علت احتمال بروز عوارض دارویی جدی برای شیرخواران، مصرف

لووفلوکساسین در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف لووفلوکساسین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به افسردگی و بیماری های روانی هستید،

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی، قلبی و کلیوی می باشید،

- اگر سابقه انفارکتوس حاد قلبی را دارید،

- اگر فردی سالمند هستید،

- اگر مبتلا به صرع هستید،

- اگر سابقه پیوند قلب، کلیه و کبد را دارید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با لووفلوکساسین، مطلع کردن پزشک مهم است.

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم

- سوکرافیت، بیسموت ساب سالیسیلات

- سایمتیدین

- سیزاپراید

- دیدانوزین

- روی و املاح آهن، کلسیم و منیزیم

- مرفین

- نیتروفورانتوئین

- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر ایبوپروفن و دیکلوفناک

- پروبنسید

- آمیودارون، دیسوپرامید، کینیدین، پروکائین آمید و سوتالول

- داروهای ضد انعقاد خوراکی نظیر وارفارین

- دیگوکسین

- اریترومايسين

- فنوتیازین

- ضد افسردگی های سه حلقه ای نظیر آمی تریپتیلین و نور تریپتیلین

- داروهای ضد دیابت سولفونیل اوره نظیر گلی بنکلامید

Levofloxacin F.C. Tablets 500mg

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردید قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهم ترین و شایع ترین عوارض دارویی لووفلوکساسین چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

سردرد، سرگیجه، اختلال در خواب، توهم، افسردگی، خواب آلودگی، وزوز گوش، بثورات جلدی، خارش، تعریق، تنگی نفس، کاهش قند خون، افزایش ضربان قلب، دل درد، سوزش سر دل، تهوع، یبوست، نفخ شکم، اسهال، خارش و ترشح واژن، تب، ادم، درد عضلات و مفاصل.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۵ عدد قرص روکشدار لووفلوکساسین ۵۰۰ میلی گرمی (۱ بلیستر ۵ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د- شرایط نگهداری لووفلوکساسین چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Lev/96.06/00

- کافئین

- تتوفیلین و تیزانیدین

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول لووفلوکساسین چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

- بزرگسالان:

برونشیت مزمن: هر ۲۴ ساعت ۵۰۰ میلی گرم به مدت ۷ روز،

سینوزیت حاد: هر ۲۴ ساعت ۵۰۰ میلی گرم به مدت ۱۴-۱۰ روز و یا هر ۲۴ ساعت ۷۵۰ میلی گرم به مدت ۵ روز،

پروستاتیت مزمن: هر ۲۴ ساعت ۵۰۰ میلی گرم به مدت ۲۸ روز،

پنومونی اکتسابی از جامعه: هر ۲۴ ساعت ۵۰۰ میلی گرم به مدت ۷-۱۴ روز و یا هر ۲۴ ساعت ۷۵۰ میلی گرم به مدت ۵ روز،

پنومونی بیمارستانی: هر ۲۴ ساعت ۷۵۰ میلی گرم به مدت ۷-۱۴ روز،

عفونت های پوست و بافت های نرم: هر ۲۴ ساعت ۷۵۰ میلی گرم به مدت ۷-۱۴ روز،

عفونت های دستگاه ادراری: هر ۲۴ ساعت ۲۵۰ میلی گرم به مدت ۱۰ روز و یا هر ۲۴ ساعت ۷۵۰ میلی گرم به مدت ۵ روز،

سیاه زخم: هر ۲۴ ساعت ۵۰۰ میلی گرم به مدت ۶۰ روز،

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لووفلوکساسین چیست؟

- قرص را با یک لیوان پر از آب میل نموده و از جویدن آن خودداری نمایید.

- ۲ ساعت قبل و یا ۶ ساعت بعد از مصرف این دارو از مصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم، سوکرافیت، فرآورده های حاوی آهن، روی و کلسیم خودداری نمایید.

- مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه و خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در طول درمان با این دارو، از قرار گرفتن به مدت طولانی در برابر نور خورشید خودداری نمایید

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نموده و دوره درمان را کامل کنید.

