

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی پنتوپرازول چگونه اثر می‌کند؟

پنتوپرازول از دسته داروهای مهار کننده پمپ پروتون می‌باشد که وظیفه اصلی آن کاهش ترشح اسید معده می‌باشد.

ب- داروی پنتوپرازول در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

- درمان کوتاه مدت زخم‌های ایجاد شده در مری بر اثر برگشت اسید معده به مری،

- درمان نگهدارنده و پیشگیرانه طولانی مدت در التهاب مری در حال بهبود، در بیماران مبتلا به برگشت اسید معده به مری،

- درمان زخم معده و زخم دوازدهه به تنهایی یا همراه با داروهای ضد هلیکوباکتر پیلوری،

- پیشگیری از ایجاد زخم‌های گوارشی بر اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن،

- درمان بلند مدت ترشح بیش از حد اسید معده در شرایط بیماری‌زا نظیر بیماری سندرم زولینگر-الیسون.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی پنتوپرازول به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی پنتوپرازول خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی پنتوپرازول و سایر داروهای مهار کننده پمپ پروتون (بنزامیدازول‌ها) نظیر امپرازول از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف داروی پنتوپرازول در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات

کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی پنتوپرازول باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر دچار کمبود ویتامین B12 و یا منیزیم خون می‌باشید،

- اگر مستعد بیماری پوکی استخوان می‌باشید،

- اگر مبتلا به بیماری‌های کبدی می‌باشید،

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می‌باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی پنتوپرازول، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- آتانائویر و نلفیناویر (داروهای درمان HIV)

- وارفارین

- کتوکونازول

- آنتی‌بیوتیک‌های حاوی استرهای آمپی‌سیلین

- داروهایی حاوی نمک‌های آهن

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول داروی پنتوپرازول چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دوز بزرگسالان:

- در درمان زخم معده ۴۰ میلی گرم یکبار در روز (در موارد شدید تا ۸۰ میلی گرم یکبار در روز) به مدت ۸ هفته تجویز می‌گردد.

- در درمان زخم دوازدهه ۴۰ میلی گرم یکبار در روز (در موارد شدید تا ۸۰ میلی گرم یکبار در روز) به مدت ۴ هفته تجویز می‌گردد.

- در درمان زخم معده و زخم دوازدهه همراه با داروهای ضد هلیکوباکتر پیلوری ۴۰ میلی گرم دو بار در روز (۴۰ میلی گرم



Pantoprazole Capsules (E.C.) 20 & 40mg

بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی داروی پنتوپرازول چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- شایع:

سردرد، اسهال، تهوع، استفراغ، شکم درد، نفخ و یبوست.

- شیوع کم:

خشکی دهان، ادم محیطی، سرگیجه، اختلالات خواب، ضعف و خستگی، خارش، جوش، درد مفاصل و ماهیچه.

- نادر:

اختلال در طعم و مزه، آفت، هپاتیت، یرقان، واکنش‌های حساسیتی، تب، افسردگی، توهم، کاهش منیزیم خون (معمولاً در مصرف طولانی مدت بیش از سه ماه) و شکستگی استخوان (معمولاً در مصرف طولانی مدت بیش از یکسال).

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۲۸ عدد کپسول (انتریک کوند) پنتوپرازول ۲۰ و یا ۴۰ میلی‌گرمی (دو بلیستر ۱۴ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری داروی پنتوپرازول چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Pan/98.01/01

قبل از صبحانه و ۴۰ میلی‌گرم قبل از شام) به مدت ۷ تا ۱۴ روز تجویز می‌گردد.

- در پیشگیری از ایجاد زخم‌های گوارشی بر اثر مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد.

- در درمان بلند مدت ترشح بیش از حد اسید معده در شرایط بیماری‌زا نظیر بیماری سندرم زولینگر-الیسون شروع درمان با دوز اولیه ۸۰ میلی‌گرم یکبار در روز (حداکثر دوز در سالمندان ۴۰ میلی‌گرم در روز) می‌باشد که درمان بسته به پاسخ درمانی بیمار تا دوز ۸۰ میلی‌گرم در روز در دو وعده مساوی تجویز می‌گردد.

دوز بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال:

- در درمان کوتاه مدت زخم‌های ایجاد شده در مری بر اثر برگشت اسید معده به مری ۲۰ تا ۸۰ میلی‌گرم یکبار در روز به مدت ۴ هفته (در صورت عدم بهبودی تکرار یک دوره ۴ هفته‌ای دیگر توصیه می‌شود) تجویز می‌گردد.

- در درمان نگهدارنده و پیشگیرانه طولانی مدت در التهاب مری در حال بهبود، در بیماران مبتلا به برگشت اسید معده به مری ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد که در صورت بازگشت علائم بیماری مقدار مصرفی تا ۴۰ میلی‌گرم در روز افزایش می‌یابد.

سالمندان و بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی:

- حداکثر مقدار مصرف ۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی و یا سیروز کبدی:

- حداکثر مقدار مصرف ۲۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی پنتوپرازول چیست؟

- دارو را به طور کامل بلعیده و از خورد کردن، جویدن و باز کردن آن خودداری نمایید.

- می‌توانید این دارو را بدون در نظر گرفتن وعده غذایی (ترجیحاً قبل از صبحانه) مصرف نمایید.

- مصرف این دارو همزمان با آنتی‌اسیدها بلامانع می‌باشد.

- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را قطع نکنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت

