

برتر باشد.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که ترشح این دارو در شیر مادر نامشخص است، لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی دیادر® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به بیماری‌های قلبی می‌باشید،

- اگر مبتلا به نارسایی کبدی می‌باشید،

- اگر مبتلا به سرطان مثانه می‌باشید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می‌باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی دیادر® مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- ریفامپین (افزایش متابولیسم پیوگلیتازون)

- جمفیبروزیل و کتوکونازول (کاهش متابولیسم پیوگلیتازون)

- میدازولام (کاهش غلظت میدازولام)

- قرص‌های ضد بارداری خوراکی محتوی نوراتیندرول و اتینیل استرادیول (کاهش غلظت پلاسمایی هر دو هورمون)

به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

ج- مقدار مصرف معمول داروی دیادر® چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دوز بزرگسالان:

- دیادر® در تک درمانی دیابت ۳۰-۱۵ میلی گرم یکبار در روز بدون توجه به صرف غذا تجویز می‌شود و در صورت نیاز

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی دیادر® چگونه اثر می‌کند؟

- دیادر® یک داروی پایین آورنده قند خون است که برای اعمال اثرات خود به وجود انسولین احتیاج دارد. این دارو در بافت‌های محیطی باعث کاهش مقاومت به انسولین می‌شود. همچنین برون ده گلوکز کبدی را کاهش می‌دهد.

ب- داروی دیادر® در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- جهت کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه با ورزش و رژیم غذایی به تنهایی یا به عنوان درمان کمکی به همراه متفورمین یا سولفونیل اوره‌ها و یا با انسولین تجویز می‌گردد.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی دیادر® به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی دیادر® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی پیوگلیتازون و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن،

- همچنین ابتلا به نارسایی احتقانی شدید قلبی،

از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف داروی دیادر® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه C قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار حاکی از تاثیر سوء بر روی جنین و میزان باروری است، اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد و یا مطالعات جامعی بر روی حیوان و زنان باردار موجود نیست. بنابراین مصرف این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که فواید استفاده از آن نسبت به خطرات ناشی از مصرف آن

## Diador® Pioglitazone (Tablets 15 & 30 mg)

### ح- مهم ترین و شایع ترین عوارض دارویی داروی دیادر® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

#### - عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: اختلالات دندانی.

**شیوع کم:** ادم محیطی (ورم پاها)، افزایش ناگهانی وزن (به علت احتباس مایعات)، بروز نارسایی قلبی و یا بدتر شدن آن، هیپوگلیسمی، افزایش تخمک گذاری، آنمی، اختلالات عملکرد کبدی (تهوع و استفراغ، درد شکم، خستگی غیر معمول، کاهش اشتها، ادرار تیره، زردی پوست و چشم‌ها)، ادم ماکولار، بروز شکستگی استخوان (معمولا در دست‌ها، بازو، پا به ویژه در زنان).

#### - عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

شایع: سردرد، میالژی (درد عضلانی)، فارتیزیت (گلو درد)، سینوزیت (آبریزش یا گرفتگی بینی) و عفونت مجاری تنفسی فوقانی (سرفه، تب، آبریزش یا گرفتگی بینی و گلو درد).

#### خ- مشخصات دارو:

هر جعبه دیادر® حاوی ۳۰ عدد قرص ۱۵ و یا ۳۰ میلی گرمی (سه بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می باشد.

#### د- شرایط نگهداری داروی دیادر® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

- از مصرف داروهای که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

ایمانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Pio/95.09/00

بیمار می توان مقدار آن را تا ۴۵ میلی گرم یکبار در روز افزایش داد.

- **دیادر®** به همراه انسولین: دوز اولیه آن ۱۵-۳۰ میلی گرم یکبار در روز بدون توجه به صرف غذا تجویز می شود و دوز جاری انسولین ادامه پیدا می کند و در صورت بروز هیپوگلیسمی و یا کاهش غلظت گلوکز پلاسما تا ۱۰۰ mg/dL و یا کمتر، باید دوز انسولین ۲۵-۱۰٪ کاهش پیدا نماید.

- **دیادر®** به همراه متفورمین: دوز اولیه آن ۱۵-۳۰ میلی گرم در روز بدون توجه به صرف غذا تجویز می شود و دوز جاری متفورمین ادامه پیدا می کند. لزوم تنظیم دوز متفورمین برای هیپوگلیسمی غیر محتمل می باشد.

- **دیادر®** به همراه سولفونیل اوره: دوز اولیه آن ۱۵-۳۰ میلی گرم در روز بدون توجه به صرف غذا تجویز می شود و دوز جاری سولفونیل اوره ادامه پیدا می کند. در صورت بروز هیپوگلیسمی باید دوز سولفونیل اوره را کاهش داد.

**توجه: حداکثر دوز بزرگسالان دیادر® ۴۵ میلی گرم در روز می باشد.**

**توجه: مصرف مطمئن و بی خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.**

**نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی دیادر® چیست؟**

- این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا با یک لیوان آب مصرف نمود.

- هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز ننمایید.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید.

**در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟**

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

**در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟**

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

