

- ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی روزانا® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟
- اگر مبتلا به بیماری‌های کبدی می‌باشد،
 - اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می‌باشد،
 - اگر سابقه مصرف الكل دارد،
 - اگر مبتلا به بیماری عضلانی، کمکاری غده تیروئید کنترل نشده و صرع می‌باشد،
 - اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،
 - اگر در دوران شیردهی می‌باشد،
 - و هرگونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.
- ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی روزانا® مطلع کردن پزشک مهم است؟
- لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتی پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.
 - آمیودارون، دیگوکسین، دیلتیازم، وراپامیل، جمفیبروزیل، نیاسین،
 - آنتی اسیدها، سایمتیدین، رانیتیدین، کلستیرامین،
 - ضدقارچ‌های آزول (فلوکونازول، ایتراکونازول و توتونازول)
 - آنتی بیوتیک‌های ماکرولیدی (آزیتروماکسین، کلاریتروماکسین و اریتروماکسین)
 - سیکلوسپورین، ضد بارداری‌های خوراکی،
 - به بیماران توصیه می‌شود فهرستی از داروهایی که مصرف می‌کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می‌کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

- ج- مقدار مصرف معمول داروی روزانا® چیست؟
- مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:
- دوز بزرگسالان:

- در درمان بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه (شامل هتروزیگوت فامیلیال و غیر فامیلیال) و دیس لیپیدمی مختلط بیمارانی که احتیاج به کاهش کمتر LDL-C دارند و یا مستعد میوپاتی می‌باشند این میزان ۵ میلی گرم در روز و در بیمارانی

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- داروی روزانا® چگونه اثر می‌کند؟

- روزانا® با مهار آنزیم اصلی سازنده اولیه کلسترول در بدن، موجب کاهش تولید کلسترول می‌گردد.

ب- داروی روزانا® در چه مواردی استفاده می‌شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- درمان کمکی همراه رژیم غذایی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و تری‌گلیسرید خون در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه

- درمان اولیه و یا کمکی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و کلسترول تام خون در بیماران مبتلا به انواع هایپرکلسترولمی فامیلیال

- پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی.

نکاتی که باید قبل از مصرف داروی روزانا® به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی روزانا® خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی روزهای استاتین، مبتلا بودن به بیماری فعلی کبدی و یا افزایش بدون توضیح آنزیم‌های کبدی، بارداری و شیردهی از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف داروی روزانا® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

صرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه X قرار داده است، بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار و انسان حاکی از خطرات جدی بر روی جنین است، بنابراین به طور کلی مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

- مصرف در شیردهی:

علی‌رغم این که اطلاعاتی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر وجود ندارد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.



Rousana®

Rosuvastatin (F.C. Tablets 5, 10, 20 & 40mg)

بعدی فارسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهم‌ترین و شایع‌ترین عوارض دارویی روزانه چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عرضه‌ای که در این برگه راهنمای ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- شایع:

سردرد، اسهال، تهوع، سرگیجه، ضعف عضلانی، عفونت و بیوست.

- شیوع کم و نادر:

کمر درد، درد عضلانی، نفخ، راش پوستی، سینوزیت، اختلال عملکرد کبدی و علائم شبی سرماخوردگی.

خ- مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص روکشدار روزانه[®] ۵، ۱۰، ۲۰ و یا ۴۰ میلی‌گرمی (سه بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

د- شرایط نگهداری دارویی روزانه[®] چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند خودداری نمایید.

که LDL-C بالای mg/dL ۱۹۰ دارند این میزان ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد.

میزان دوز نگهدارنده دریافتی بر اساس نیاز بیمار و پاسخ‌های درمانی در طی یک دوره ۲-۴ هفته‌ای توسط پزشک تنظیم می‌گردد.

حداکثر مقدار تجویزی ۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

- در درمان هایپرکلسترولمی فامیلیال دوز تجویزی ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد. حداکثر مقدار تجویزی ۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

- در پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز تجویز می‌گردد. در سالمندان بالای ۷۰ سال، بیماران نژاد شرق آسیا و یا بیماران مستعد میوپاتی مقدار دوز شروع ۵ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد که در صورت نیاز ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز افزایش پیدا می‌کند. حداکثر مقدار تجویزی ۲۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

- در صورت مصرف همزمان با سیکلوسپورین حداکثر مقدار تجویزی ۵ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد.

- در صورت مصرف همزمان با فیبرات‌ها حداکثر مقدار تجویزی ۱۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد.

- در بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه (کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه) مقدار دوز شروع ۵ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد. حداکثر مقدار تجویزی ۱۰ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد.

توجه: مصرف مطمئن و بی خطر این دارو در کودکان زیر ۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف دارویی روزانه[®] چیست؟

- در دوران مصرف این دارو، از الکل و آب گریپ فروت استفاده نکنید.

- این دارو را بدون در نظر گرفتن وعده غذایی به صورت تک دوز و در یک زمان معین مصرف نمایید.

- دوره درمان را کامل کنید و بدون دستور پزشک درمان را قطع نکنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت

www.dorsadarou.com

رایانه‌جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Ros/95.09/00

سایت اینترنتی:



www.dorsapharma.com



dorsadarou



021- 54612000



تهران- طرشت- محله تیموری- بلوار شهید صالحی
نبش سه راه اکبری- برج فناوری شریف- طبقه هشتم