

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

**الف - داروی ویگرودیت® چگونه اثر می کند؟**

- ویگرودیت® یک مهارکننده انتخابی آنزیمی (فسفودی استراز نوع ۵) می باشد که با افزایش جریان خون در آلت تناسلی مردان هنگام تحریکات جنسی، به ایجاد نعوظ کمک می کند.

**ب- داروی ویگرودیت® در چه مواردی استفاده می شود؟**

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

- ویگرودیت® جهت درمان اختلالات نعوظ در مردان تجویز می گردد.

**نکاتی که باید قبل از مصرف داروی ویگرودیت® به آنها توجه نمود:**

**پ- در چه مواردی باید از مصرف داروی ویگرودیت® خودداری کرد؟**

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی سیلدنافیل و مصرف همزمان (منظم و یا غیر منظم) هر نوع شکل دارویی حاوی نیتراتها از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

**ت- ملاحظات مصرف داروی ویگرودیت® در دوران بارداری و شیردهی چیست؟**

ویگرودیت® در زنان استفاده درمانی ندارد و نباید مصرف شود.

**ث- مواردی را که قبل از مصرف داروی ویگرودیت® باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟**

- اگر مبتلا به بیماریهای قلبی و پرفشاری خون کنترل

نشده می باشید،

- اگر دارای سابقه سکته مغزی و یا فشار خون پایین می باشید،

- اگر مبتلا به اختلال شکلی آلت تناسلی و یا مستعد نعوظ دردناک و طولانی می باشید،

- اگر مبتلا به بیماریهای کبدی و یا نارسایی کلیوی می باشید،

- اگر دچار زخم فعال گوارشی و بیماریهای ارثی بینایی و یا شبکیه چشم می باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

**ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با داروی ویگرودیت®، مطلع کردن پزشک مهم است؟**

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- انواع داروهای ضد فشار خون و نیتراتها نظیر نیتروگلیسرین و آمیل نیتريت،

- داروهای مهار کننده پروتئاز نظیر داروهای ضد ایدز، - آنتی اسیدها، داروهای ضد انعقاد، سایمتیدین، تاکرولیموس،

- آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی نظیر اریترومايسين و آزیترومایسین،

- داروهای ضد قارچ نظیر ایتراکونازول و کتوکونازول،

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

**چ- مقدار مصرف معمول داروی ویگرودیت® چیست؟**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

## **Vigrodit®** **Sildenafil (Scored F.C. Tablets 50 & 100 mg)**

### ویگرو دیت® چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه‌ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

#### - شایع:

تاری دید، کمر درد، سوء هاضمه، برافروختگی صورت، علائم شبه آنفلوآنزا، سردرد، درد قفسه سینه، سرگیجه، درد عضلانی.

#### - شیوع کم و نادر:

استفراغ، اسهال، ادم محیطی، خشکی دهان، مشکلات قلبی و عروقی، عفونت مجاری ادراری، نعوظ طولانی و مداوم.

در صورت بروز درد قفسه سینه، کاهش یا از بین رفتن بینایی و یا طولانی شدن نعوظ بیش از ۴ ساعت به مراکز درمانی مراجعه نموده و پزشک مسئول را از مصرف ویگرو دیت® مطلع نمایید.

#### - مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۴ عدد قرص روکشدار خطدار ویگرو دیت® ۵۰ یا ۱۰۰ میلی گرمی (یک بلیستر ۴ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

#### - شرایط نگهداری داروی ویگرو دیت® چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته جدا خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند خودداری نمایید.

[www.dorsadarou.com](http://www.dorsadarou.com)

سایت اینترنتی: [customerservice@dorsadarou.com](mailto:customerservice@dorsadarou.com)

Des.Lef.Sil/94.05/00

### دوز بزرگسالان:

- مقدار شروع مصرف معمول ویگرو دیت® در درمان اختلالات نعوظ ۵۰ میلی‌گرم به فاصله حدود یک ساعت (در محدوده زمانی ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت) قبل از آمیزش جنسی می‌باشد که این مقدار را می‌توان براساس پاسخ درمانی و تحمل بیمار از ۲۵ میلی‌گرم تا حداکثر ۱۰۰ میلی‌گرم در روز تجویز نمود.

در سالمندان بالای ۶۵ سال و افراد مبتلا به نارسایی کلیوی و کبدی مقدار مصرف توصیه شده از ۲۵ میلی‌گرم، به فاصله حدود یک ساعت (در محدوده زمانی ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت) قبل از آمیزش جنسی شروع می‌شود.

توجه: حداکثر دوز روزانه در بزرگسالان ۱۰۰ میلی‌گرم یک بار روز می‌باشد.

توجه: این دارو نباید در افراد زیر ۱۸ سال مصرف شود.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی ویگرو دیت® چیست؟

- توجه داشته باشید ویگرو دیت® تنها همزمان با تحریکات جنسی به ایجاد نعوظ کمک خواهد کرد و اگر اختلال نعوظ ندارید نباید از این دارو استفاده نمایید.

- این دارو را همراه غذا و یا بدون آن با یک لیوان پر از آب مصرف نمایید، ولی لازم به ذکر است مصرف غذاهای پر چرب شروع اثر دارو را به تاخیر می‌اندازد.

- قبل از مصرف ویگرو دیت®، از الکل و آب گریپ فروت استفاده نکنید.

- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح- مهمترین و شایعترین عوارض دارویی قرص

