

انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی باردار تاثیر سوئی بر روی جنین و میزان باروری نداشته است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.

- مصرف در شیردهی:

از آن جایی که اطلاعات کافی در مورد ترشح این دارو در شیر انسان در دسترس نمی باشد، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط انجام گیرد.

ث - مواردی را که قبل از مصرف سیتاگلیپتین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می باشید،

- اگر مبتلا به بیماری پانکراتیت می باشید،

- اگر مبتلا به بیماری سنگ کیسه صفرا می باشید،

- اگر سابقه اعتیاد به الکل دارید،

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید،

- اگر در دوران شیردهی می باشید،

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج - در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با سیتاگلیپتین، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفاً در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتماً پزشک و یا داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین موجب افزایش جزئی سطح خونی دیگوکسین می شود.

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به دکتر و یا داروساز خود نشان دهند.

چ - مقدار مصرف معمول سیتاگلیپتین چیست؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف - سیتاگلیپتین چگونه اثر می کند؟

- سیتاگلیپتین از دسته داروهای مهار کننده دی پپتیل پتیداز تیپ چهار می باشد که از تجزیه هورمون (اینکرتین) موثر در کنترل ترشح انسولین در بدن جلوگیری می کند.

ب - سیتاگلیپتین در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

- این دارو به تنهایی در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع دو همراه با ورزش و رژیم غذایی و یا به عنوان درمان کمکی به همراه متفورمین و یا داروهای نظیر پیوگلیتازون (تيازولیدین دیون ها) جهت کنترل قند خون تجویز می گردد.

نکاتی که باید قبل از مصرف سیتاگلیپتین به آنها توجه نمود:

پ - در چه مواردی باید از مصرف سیتاگلیپتین خودداری کرد؟

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به داروی سیتاگلیپتین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن

- همچنین ابتلا به دیابت نوع یک و کتواسیدوز دیابتی (افزایش کتون ها در خون یا ادرار)

از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت - ملاحظات مصرف سیتاگلیپتین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزو گروه B قرار داده است، بدین معنی که مطالعات

Sitagliptin

F.C. Tablets 25, 50 & 100mg

برای درمان دیابت قندی نوع ۲:

- **بزرگسالان:** مقدار مصرف این دارو ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز به تنهایی یا همراه با متفورمین یا داروهایی نظیر پیوگلیتازون (تیازولیدین دیون ها) می باشد.

- **بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه (کلیرانس کراتینین بین ۳۰ تا ۵۰ میلی لیتر در دقیقه):** ۵۰ میلی گرم یکبار در روز.

- **بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه (کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه):** ۲۵ میلی گرم یکبار در روز.

توجه: مصرف مطمئن و بی خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف سیتاگلیپتین چیست؟

- این دارو را می توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- قند خون را به صورت دوره ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.

- در شرایط استرس مانند تب، تصادف، عفونت و یا جراحی، ممکن است مقدار مصرف دارو تغییر یابد.

- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می گردد.

- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده چه باید کرد؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

ح - مهم ترین و شایع ترین عوارض دارویی سیتاگلیپتین چیست؟

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر یا هر گونه عارضه ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید.

- **عوارض شایع:** نازوفارنژیت، سردرد، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، ادم محیطی و عوارض گوارشی (شامل دل درد، تهوع و اسهال).

- **عوارض غیر شایع:** بی اشتهایی، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان و استئوآرتریت.

خ - مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص روکشدار سیتاگلیپتین ۲۵ یا ۵۰ و یا ۱۰۰ میلی گرمی (۳ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارو می باشد.

د - شرایط نگهداری سیتاگلیپتین چیست؟

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده اند، خودداری نمایید.

www.dorsadarou.com

سایت اینترنتی:

رایانامه جهت ارتباط مشتری: customerservice@dorsadarou.com

Des.Lef.Sit/96.06/01



www.dorsapharma.com



[dorsadarou](https://www.instagram.com/dorsadarou)



021- 54612000



تهران-طرشت-محله تیموری-بلوار شهید صالحی
نبش سه راه اکبری-برج فتاوری شریف-طبقه هشتم