

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

چنانچه سؤال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظران رسید، از پزشک یا دکتر داروساز خود سؤال کنید.

الف- لیناگلیپتین چگونه اثر می کند؟

لیناگلیپتین از دسته داروهای مهارکننده دی پپتیل پپتیداز تیپ چهار می باشد که سبب افزایش ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون می شود.

ب- لیناگلیپتین در چه مواردی استفاده می شود؟

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

این دارو به تنهایی در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع ۲ و یا همراه با انسولین و سایر داروهای ضد دیابت در زمانی که درمان های قبلی سطح قند خون بیمار را به خوبی کنترل نکرده باشند تجویز می شود.

نکاتی که باید قبل از مصرف لیناگلیپتین به آنها توجه نمود:

پ- در چه مواردی باید از مصرف لیناگلیپتین خودداری کرد؟

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی لیناگلیپتین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن؛
- در صورت ابتلا به دیابت نوع یک و کتواسیدوز دیابتی (افزایش کتون ها در خون یا ادرار)؛
از مصرف این دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

ت- ملاحظات مصرف لیناگلیپتین در دوران بارداری و شیردهی چیست؟

- مصرف در بارداری:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر اثرات دارو در دوران بارداری در دسترس نمی باشد، مصرف آن در این دوران توصیه نمی شود.

- مصرف در شیردهی:

از آنجایی که این دارو در شیر مادر ترشح می شود، لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

ث- مواردی را که قبل از مصرف لیناگلیپتین باید به پزشک خود اطلاع دهید، چیست؟

- اگر مبتلا به نارسایی کلیوی می باشید؛

- اگر مبتلا به بیماری پانکراتیت می باشید؛

- اگر مبتلا به نارسایی قلبی می باشید؛

- اگر مبتلا به درد شدید مفاصل می باشید؛

- اگر داروهای کاهنده قند خون مصرف می کنید؛

- اگر داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنید؛

- اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛

- اگر در دوران شیردهی می باشید؛

و هر گونه شرایط پزشکی دیگر را به پزشک خود اطلاع دهید.

ج- در صورت مصرف همزمان چه داروهایی با لیناگلیپتین، مطلع کردن پزشک مهم است؟

لطفا در صورت استفاده از هر نوع دارویی از جمله داروهای بدون نسخه و به ویژه مواردی که در زیر آمده است حتما پزشک و یا دکتر داروساز خود را مطلع نمایید.

- مصرف همزمان این دارو با ریفامپیسین، داروهای ضد تشنج مانند فنوباربیتال، فنی تونین، پریمیدون، کاربامازپین و داروی انزالوتامید سبب کاهش اثرات لیناگلیپتین می شود.

- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای کاهنده قند خون موجب افزایش اثرات دارو می شود.

به بیماران توصیه می شود فهرستی از داروهایی که مصرف می کنند را همراه خود داشته باشند تا زمانی که یک داروی جدید را دریافت می کنند آن را به پزشک و یا دکتر داروساز خود نشان دهند.

چ- مقدار مصرف معمول لیناگلیپتین چیست؟

Linagliptin

F.C Tablets 5 mg

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

برای درمان دیابت قندی نوع ۲:
- بزرگسالان: مقدار مصرف این دارو ۵ میلی‌گرم یکبار در روز می‌باشد. در صورتی که لیناگلیپتین به همراه متفورمین تجویز شود ممکن است نیاز باشد در دو دوز منقسم مصرف گردد. همچنین در صورتی که لیناگلیپتین به همراه داروهای گروه سولفونیل اوره یا انسولین تجویز شود ممکن است با توجه به پاسخ درمانی بیمار، نیاز به کاهش مقدار مصرف این داروها باشد.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

در صورت فراموشی مصرف یک یا چند نوبت دارو چه باید کرد؟
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

چگونه مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.
نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.

توجه: مصرف مطمئن و بی‌خطر این دارو در افراد زیر ۱۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نکات مهم در خصوص نحوه صحیح مصرف لیناگلیپتین چیست؟
- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.
- در طول دوره مصرف این دارو، قند خون را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می‌گردد.
- دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایید و دوره درمان را کامل کنید.