



Spray

Nitropuff

Nitroglycerin

400mcg/Puff



- تسکین فوری درد قفسه سینه
- پیشگیری از حملات آنژین صدری و نارسایی بطن چپ
- عملکرد به موقع به علت جذب سریع خونی از مویرگ های زیر زبانی
- استفاده و حمل آسان
- قیمت مقرون به صرفه

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

TUV NORD



FDO192746
General Solid Dosage Forms



PRM-99-16
For APIs Product

نیتروپاف ۴۰۰ میکروگرم نیتروگلیسرین در هر پاف

گروه دارویی: قلبی - عروقی (وازدیلاتورها)

مکانیسم اثر: اسپری نیتروپاف[®] دارای ماده موثره نیتروگلیسرین است که از طریق مکانیسم های مختلف باعث کاهش اکسیژن مورد نیاز قلبی می گردد. همچنین با توزیع موثر جریان خون در قلب میزان اکسیژن رسانی به قلب را افزایش داده و نسبت متعادلی از نیاز به اکسیژن و عملکرد قلبی ایجاد می کند.

موارد مصرف: اسپری زیر زبانی نیتروپاف[®] در مواقع اورژانس قلبی استفاده می شود. این دارو جهت تسکین فوری درد سینه و نجات جان بیمار از حملات آنژین صدری و نارسایی بطن چپ و یا به منظور پیشگیری از شروع این حملات ۱۰-۵ دقیقه پیش از شرایط ایجاد کننده آن مانند فعالیت فیزیکی و استرس کاربرد دارد.

مصرف در بارداری: گروه C

مصرف در شیردهی: از آنجا که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد، منافع و مضرات احتمالی ناشی از استفاده این دارو در دوران شیردهی باید در نظر گرفته شود.

موارد احتیاط: از مصرف هم زمان این دارو با داروهای موثر در ناتوانی جنسی نظیر سیلدنافیل و تادالافیل تا ۴۸ ساعت بعد از مصرف آنها، پرهیز شود.

مصرف فرآورده های حاوی الکل، داروهای پایین آورنده فشارخون و یا داروهای گشادکننده عروق، هپارین، دی هیدروارگوتامین با احتیاط انجام شود.

مقدار مصرف: مقدار مصرف هر دارو با توجه به شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می شود. اما به طور کلی در موارد پیشگیری و تسکین فوری درد قفسه سینه ناشی از آنژین صدری:

بزرگسالان: هر بار یک تا دو پاف زیر یا روی زبان اسپری شود. سپس دهان را بسته نگه داشته و از استنشاق آن خودداری نمایند.

توجه: در صورت عدم بهبودی درد قفسه سینه، تا زمان انتقال بیمار به نزدیک ترین مرکز درمانی، مصرف این دارو با فاصله زمانی حداقل ۵ دقیقه تا سه نوبت قابل تکرار است. توجه کنید که در بازه ۱۵ دقیقه ای بیش از ۳ پاف مجاز نمی باشد.

نحوه مصرف صحیح دارو: پیش از استفاده از بطری جدید نیتروپاف[®] یا بطری که بیش از یک هفته از آن استفاده نشده است، باید کلید اسپری را محکم فشار داده و اولین پاف را به سمت هوا اسپری نمایند تا پمپ اسپری آماده به کار شود. سپس بطری را به حالت عمودی و رو به بالا در جلوی دهان گرفته و به سمت زیر زبان یا روی زبان اسپری نمایند. پس از اسپری دهان را بسته نگه داشته و چند لحظه نفس خود را حبس کنند.

هنگام مصرف دارو بهتر است در حالت نشسته باشند و از تکان دادن اسپری پیش از مصرف خودداری نمایند.

عوارض دارویی:

سر درد، تهوع، پاراستزی.

مشخصات دارو: هر جعبه داروی نیتروپاف[®] حاوی یک عدد اسپری زیر زبانی نیتروگلیسرین 400 mcg/puff (۱۰۰ پاف) می باشد.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، دور از نور و یخ زدگی و در بسته بندی اصلی، دور از دسترس کودکان و به صورت ایستاده نگهداری شود.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نموده و از اسپری کردن دارو در مجاورت شعله آتش پرهیز شود.

